

Poprawa ruchomości bioder

+2. tydzień - Progresja - większa kontrola, nieco większy zakres lub dłuższy czas pracy.

Cel
Ruch biodra w zgięciu, wyproście, rotacji i odwiedzeniu przy możliwie stabilnej miednicy.

Uwaga kliniczna
Przy nasilającym się bólu pachwiny, blokowaniu stawu lub bólu nocnym zakres powinien być oceniony indywidualnie.

1 JOGA 1 90/90 - progresja

Usiądź z jedną nogą z przodu i drugą z boku, obie ugięte około 90°. Usiądź wysoko, a następnie delikatnie pochyl tułów nad przednią nogą. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 30-45 s x 2-3

Wskazówka: Nie dociskaj kolan na siłę do podłogi. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

2 JOGA 2 Niski wykrok - progresja

Z półkłęku podwini lekko miednicę i przesun ją do przodu, czując przód biodra nogi zakrocznej. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 30-45 s x 2-3

Wskazówka: Nie wyginaj lędźwi. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

3 POZIOM 1 - łatwy Kolano do klatki + krążenie biodrem - progresja

Leżąc na plecach, przyciągnij jedno kolano do komfortowego zakresu i wykonuj małe kółka udem w stawie biodrowym. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 10-15 powt. x 2-3 serie

Wskazówka: Miednica pozostaje możliwie spokojna. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

4 POZIOM 2 - średni Wycieraczki w leżeniu - progresja

Leżenie na plecach, kolana ugięte, stopy szerzej. Opuszczaj oba kolana w jedną stronę, wróć i powtórz w drugą. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 10-15 powt. x 2-3 serie

Wskazówka: Zakres bez bólu w pachwinie. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

5 POZIOM 3 - trudniejszy Przysiad kozacki - progresja

Stań szeroko. Przenieś ciężar na jedną nogę, uginając ją, a drugą pozostaw bardziej wyprostowaną. Wróć przez środek i zmień stronę. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 10-15 powt. x 2-3 serie

Wskazówka: Zaczynij płytko i trzymaj się oparcia, jeśli potrzeba. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

Zasada progresji: przejdź do kolejnego etapu dopiero, gdy technika pozostaje dobra, a objawy nie są wyraźnie gorsze po sesji ani następnego dnia.
Program dobiera fizjoterapeuta do badania i tolerancji pacjenta.