

Poprawa ruchomości bioder

+4. tydzień - Etap funkcjonalny - mniej podparcia, większa kontrola i tolerancja obciążenia.

Cel
Ruch biodra w zgięciu, wyprostie, rotacji i odwiedzeniu przy możliwie stabilnej miednicy.

Uwaga kliniczna
Przy nasilającym się bólu pachwiny, blokowaniu stawu lub bólu nocnym zakres powinien być oceniony indywidualnie.

1 JOGA 1 90/90 - wariant funkcjonalny

Usiądź z jedną nogą z przodu i drugą z boku, obie ugięte około 90°. Usiądź wysoko, a następnie delikatnie pochyl tułów nad przednią nogą. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 30-60 s x 2-3

Wskazówka: Nie dociskaj kolan na siłę do podłogi. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

2 JOGA 2 Niski wykrok - wariant funkcjonalny

Z półkłęku podwiń lekko miednicę i przesun ją do przodu, czując przód biodra nogi zakrocznej. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 30-60 s x 2-3

Wskazówka: Nie wyginaj lędźwi. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

3 POZIOM 1 - łatwy Kolano do klatki + krążenie biodrem - wariant funkcjonalny

Leżąc na plecach, przyciągnij jedno kolano do komfortowego zakresu i wykonuj małe kółka udem w stawie biodrowym. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 8-15 powt. x 2-4 serie

Wskazówka: Miednica pozostaje możliwie spokojna. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

4 POZIOM 2 - średni Wycieraczki w leżeniu - wariant funkcjonalny

Leżenie na plecach, kolana ugięte, stopy szerzej. Opuszczaj oba kolana w jedną stronę, wróć i powtórz w drugą. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 8-15 powt. x 2-4 serie

Wskazówka: Zakres bez bólu w pachwinie. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

5 POZIOM 3 - trudniejszy Przysiad kozacki - wariant funkcjonalny

Stań szeroko. Przenieś ciężar na jedną nogę, uginając ją, a drugą pozostaw bardziej wyprostowaną. Wróć przez środek i zmień stronę. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 8-15 powt. x 2-4 serie

Wskazówka: Zaczynaj płytko i trzymaj się oparcia, jeśli potrzeba. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

Zasada progresji: przejdź do kolejnego etapu dopiero, gdy technika pozostaje dobra, a objawy nie są wyraźnie gorsze po sesji ani następnego dnia.
Program dobiera fizjoterapeuta do badania i tolerancji pacjenta.