

Wzmocnienie przepony

+2. tydzień - Progresja - większa kontrola, nieco większy zakres lub dłuższy czas pracy.

Cel
Poprawa kontroli i wytrzymałości oddechowej bez sprzętu poprzez pracę przepony w coraz trudniejszych pozycjach i podczas lekkiego wysiłku.

Uwaga kliniczna
Bez urządzenia z oporem są to głównie ćwiczenia kontroli i wytrzymałości oddechowej, nie precyzyjny trening siły mięśni wdechowych. Przy chorobach płuc/serca dawkę należy ustalić indywidualnie.

1 JOGA 1 Most z pauzą 2-3 s

Leżenie na plecach. Na wydechu unieś miednicę do mostu. Utrzymując pozycję, wykonaj 2-3 spokojne oddechy do dolnych żeber i opuść biodra. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 30-45 s x 2-3

Wskazówka: Nie wstrzymuj oddechu w górze. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

2 JOGA 2 Krzesło - dłuższe utrzymanie

Stań, cofnij biodra jak do siadania i ugnij kolana. Utrzymuj pozycję, wykonując spokojne wdechy nosem i dłuższe wydechy. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 30-45 s x 2-3

Wskazówka: Przerwij przy duszności nieproporcjonalnej do wysiłku lub zawrotach głowy. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

3 POZIOM 1 - łatwy Oddech przeponowy w leżeniu - progresja

Połóż jedną dłoń na mostku, drugą na brzuchu/dolnych żebrach. Wdech kieruj w dół i na boki, wydech swobodny. Z czasem wydłużaj serię bez zwiększania objętości pojedynczego oddechu. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 10-15 powt. x 2-3 serie

Wskazówka: Ruch ręki na górnej klatce ma być niewielki. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

4 POZIOM 2 - średni Oddech przeponowy w klęku podpartym - progresja

Klęk podparty, kręgosłup neutralny. Wdech nosem do boków i tyłu dolnych żeber; wydech spokojny, z lekkim napięciem brzucha. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 10-15 powt. x 2-3 serie

Wskazówka: Nie zapadaj się w barkach i nie unosz ich przy wdechu. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

5 POZIOM 3 - trudniejszy Marsz w miejscu bez stałego podparcia

Maszeruj spokojnie, unosząc kolana do komfortowej wysokości. Utrzymuj rytm: 2-3 kroki na wdech i 3-4 kroki na wydech, bez zadyszki. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 10-15 powt. x 2-3 serie

Wskazówka: Tempo pozwala mówić krótkim zdaniem; przerwij przy bólu w klatce lub znacznej duszności. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

Zasada progresji: przejdź do kolejnego etapu dopiero, gdy technika pozostaje dobra, a objawy nie są wyraźnie gorsze po sesji ani następnego dnia.
Program dobiera fizjoterapeuta do badania i tolerancji pacjenta.