

Ból barku / stożek rotatorów

+4. tydzień - Etap funkcjonalny - mniej podparcia, większa kontrola i tolerancja obciążenia.

Cel
Poprawa tolerancji unoszenia ramienia i stopniowe wzmacnianie stożka rotatorów oraz łopatki.

Uwaga kliniczna
Ćwiczenia dobieraj do drażliwości. Po świeżym urazie z nagłą utratą siły lub niemożnością uniesienia ramienia wymagana jest dalsza diagnostyka.

1 JOGA 1

Szczeniak przy ścianie - wariant funkcjonalny

Stań przed ścianą, oprzyj dłonie i cofnij biodra, wydłużając boki tułowia oraz obręcz barkową bez wciskania barku w ból. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 30-60 s x 2-3

Wskazówka: Zakres ma być swobodny; nie unosz barków do uszu. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

2 JOGA 2

Orzeł - ramiona - wariant funkcjonalny

Skrzyżuj ramiona przed klatką, unieś łokcie do wygodnej wysokości i spokojnie oddychaj w górną część pleców. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 30-60 s x 2-3

Wskazówka: Bez mrowienia i ostrego bólu barku. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

3 POZIOM 1 - łatwy

Izometria rotacji zewnętrznej przy ścianie - wariant funkcjonalny

Stań bokiem do ściany, łokieć przy tułowiu i delikatnie naciskaj grzbietem dłoni na ścianę bez ruchu barku. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 8-15 powt. x 2-4 serie

Wskazówka: Siła umiarkowana; ból nie powinien narastać po serii. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

4 POZIOM 2 - średni

Ślizg po ścianie + odklejenie dłoni

Przesuwaj przedramiona w górę po ścianie, utrzymując szyję rozluźnioną i łopatkę płynnie obracającą się ku górze. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 8-15 powt. x 2-4 serie

Wskazówka: Nie wypychaj żeber do przodu. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

5 POZIOM 3 - trudniejszy

Scaption bez obciążenia - wariant funkcjonalny

Unieś ramiona w płaszczyźnie około 30° przed bokiem ciała do tolerowanego zakresu, powoli opuść. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 8-15 powt. x 2-4 serie

Wskazówka: Ruch kontrolowany, bez szarpania i unoszenia barków. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

Zasada progresji: przejdź do kolejnego etapu dopiero, gdy technika pozostaje dobra, a objawy nie są wyraźnie gorsze po sesji ani następnego dnia.
Program dobiera fizjoterapeuta do badania i tolerancji pacjenta.