

Ból barku / stożek rotatorów

Podtrzymanie - Utrzymanie efektu - mniejsza częstotliwość, dobra jakość i funkcjonalne warianty.

Cel
Poprawa tolerancji unoszenia ramienia i stopniowe wzmacnianie stożka rotatorów oraz łopatki.

Uwaga kliniczna
Ćwiczenia dobieraj do drażliwości. Po świeżym urazie z nagłą utratą siły lub niemożnością uniesienia ramienia wymagana jest dalsza diagnostyka.

1 JOGA 1

Szczeniak przy ścianie - wariant podtrzymujący

Stań przed ścianą, oprzyj dłonie i cofnij biodra, wydłużając boki tułowia oraz obręcz barkową bez wciskania barku w ból. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 30-60 s x 1-2, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Zakres ma być swobodny; nie unosz barków do uszu. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

2 JOGA 2

Orzeł - ramiona - wariant podtrzymujący

Skrzyżuj ramiona przed klatką, unieś łokcie do wygodnej wysokości i spokojnie oddychaj w górną część pleców. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 30-60 s x 1-2, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Bez mrowienia i ostrego bólu barku. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

3 POZIOM 1 - łatwy

Izometria rotacji zewnętrznej przy ścianie - wariant podtrzymujący

Stań bokiem do ściany, łokieć przy tułowiu i delikatnie naciskaj grzbietem dłoni na ścianę bez ruchu barku. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 8-12 powt. x 2 serie, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Siła umiarkowana; ból nie powinien narastać po serii. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

4 POZIOM 2 - średni

Ślizg po ścianie 2-3x/tydz.

Przesuwaj przedramiona w górę po ścianie, utrzymując szyję rozluźnioną i łopatkę płynnie obracającą się ku górze. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 8-12 powt. x 2 serie, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Nie wypychaj żeber do przodu. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

5 POZIOM 3 - trudniejszy

Scaption bez obciążenia - wariant podtrzymujący

Unieś ramiona w płaszczyźnie około 30° przed bokiem ciała do tolerowanego zakresu, powoli opuść. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 8-12 powt. x 2 serie, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Ruch kontrolowany, bez szarpania i unoszenia barków. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

Zasada progresji: przejdź do kolejnego etapu dopiero, gdy technika pozostaje dobra, a objawy nie są wyraźnie gorsze po sesji ani następnego dnia.
Program dobiera fizjoterapeuta do badania i tolerancji pacjenta.