

Kontrola łopatki / dyskineza

1. tydzień - Etap wprowadzający - technika, tolerancja ruchu, mała/umiarkowana objętość.

Cel
Poprawa kontroli łopatki podczas unoszenia i obciążania kończyny górnej.

Uwaga kliniczna
Celem nie jest sztywne „ściągnięcie łopatek”, lecz płynna współpraca łopatki z ramieniem i klatką piersiową.

1 JOGA 1 Koci grzbiet z aktywnym odepchnięciem dłoni

W klęku podpartym zaokrąglaj łagodnie odcinek piersiowy, aktywnie odpychając podłogę i pozwalając łopatom rozsunąć się.

Dawka: 8-12 cykli

Wskazówka: Nie zapadaj się między barkami.

2 JOGA 2 Deska wysoka - aktywna łopatka

W podporze na dłoniach utrzymaj łokcie proste i delikatnie „odepchnij podłogę”, nie zaokrąglając przesadnie pleców.

Dawka: 10-20 s x 2-3

Wskazówka: Zaczynaj z kolan, jeśli pełny podpor jest za trudny.

3 POZIOM 1 - łatwy Serratus punch w leżeniu

Leżąc na plecach unieś rękę do sufitu, a następnie bez zginania łokcia sięgnij dłonią wyżej, unosząc łopatkę od podłoża.

Dawka: 10-15 x 2

Wskazówka: Ruch mały i płynny.

4 POZIOM 2 - średni Wall slide z odepchnięciem

Przesuwaj przedramiona po ścianie do góry, utrzymując lekkie odepchnięcie i spokojną szyję.

Dawka: 8-12 x 2-3

Wskazówka: Nie dociskaj łopatek do kręgosłupa.

5 POZIOM 3 - trudniejszy Y przy ścianie

Stań twarzą do ściany, unieś ręce po skosie do litery Y i delikatnie odklej dłonie bez unoszenia barków.

Dawka: 6-10 x 2-3

Wskazówka: Zakres mniejszy, jeśli pojawia się kompensacja szyją.

Zasada progresji: przejdź do kolejnego etapu dopiero, gdy technika pozostaje dobra, a objawy nie są wyraźnie gorsze po sesji ani następnego dnia.
Program dobiera fizjoterapeuta do badania i tolerancji pacjenta.