

Kontrola łopatki / dyskineza

+4. tydzień - Etap funkcjonalny - mniej podparcia, większa kontrola i tolerancja obciążenia.

Cel
Poprawa kontroli łopatki podczas unoszenia i obciążania kończyny górnej.

Uwaga kliniczna
Celem nie jest sztywne „ściągnięcie łopatek”, lecz płynna współpraca łopatki z ramieniem i klatką piersiową.

1 JOGA 1 Koci grzbiet z aktywnym odepchnięciem dłoni - wariant funkcjonalny

W klęku podpartym zaokrąglaj łagodnie odcinek piersiowy, aktywnie odpychając podłogę i pozwalając łopatom rozsunąć się. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 30-60 s x 2-3

Wskazówka: Nie zapadaj się między barkami. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

2 JOGA 2 Deska z naprzemiennym ruchem kończyny

W podporze na dłoniach utrzymaj łokcie proste i delikatnie „odepchnij podłogę”, nie zaokrąglając przesadnie pleców. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 30-60 s x 2-3

Wskazówka: Zaczynj z kolan, jeśli pełny podpor jest za trudny. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

3 POZIOM 1 - łatwy Serratus punch w leżeniu - wariant funkcjonalny

Leżąc na plecach unieś rękę do sufitu, a następnie bez zginania łokcia sięgnij dłonią wyżej, unosząc łopatkę od podłoża. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 8-15 powt. x 2-4 serie

Wskazówka: Ruch mały i płynny. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

4 POZIOM 2 - średni Wall slide + lekkie odklejenie dłoni

Przesuwaj przedramiona po ścianie do góry, utrzymując lekkie odepchnięcie i spokojną szyję. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 8-15 powt. x 2-4 serie

Wskazówka: Nie dociskaj łopatek do kręgosłupa. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

5 POZIOM 3 - trudniejszy Y przy ścianie - wariant funkcjonalny

Stań twarzą do ściany, unieś ręce po skosie do litery Y i delikatnie odklej dłonie bez unoszenia barków. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 8-15 powt. x 2-4 serie

Wskazówka: Zakres mniejszy, jeśli pojawia się kompensacja szyją. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

Zasada progresji: przejdź do kolejnego etapu dopiero, gdy technika pozostaje dobra, a objawy nie są wyraźnie gorsze po sesji ani następnego dnia.
Program dobiera fizjoterapeuta do badania i tolerancji pacjenta.