

Sztywność barku / zamrożony bark

1. tydzień - Etap wprowadzający - technika, tolerancja ruchu, mała/umiarkowana objętość.

Cel
Stopniowa poprawa tolerancji ruchu i funkcji bez forsowania bolesnego końcowego zakresu.

Uwaga kliniczna
W wysokiej drażliwości preferuj częste, krótkie i łagodne ruchy. Agresywne rozciąganie może nasilić objawy.

1 JOGA 1 Pozycja dziecka z rękami na podwyższeniu

Oprzyj dłonie na krześle lub łóżku i cofnij biodra, pozwalając barkom wejść w wygodne zgięcie.

Dawka: 20-30 s x 2-3

Wskazówka: Nie wciskaj barku w ból.

2 JOGA 2 Orzeł - łagodny wariant ramion

Skrzyżuj ramiona przed klatką i unieś łokcie tylko do komfortowego poziomu.

Dawka: 20 s/stronę x 2

Wskazówka: Pomiń przy ostrym bólu przedniej części barku.

3 POZIOM 1 - łatwy Wahadło Codmana

Podopryj się zdrową ręką, rozluźnij bolesną kończynę i wykonuj małe koła oraz ruchy przód-tył.

Dawka: 30-60 s x 2-3

Wskazówka: Ramię ma być rozluźnione.

4 POZIOM 2 - średni Ślizg ręki po stole

Siedząc przesuwaj dłonie po stole do przodu, pozwalając tułowi lekko pochylić się za ręką.

Dawka: 8-12 x 2-3

Wskazówka: Nie unosz barku do ucha.

5 POZIOM 3 - trudniejszy Wspinanie palcami po ścianie

Wejdz palcami po ścianie do tolerowanego poziomu i powoli wróć.

Dawka: 6-10 x 2

Wskazówka: Nie utrzymuj długo bolesnego końca zakresu.

Zasada progresji: przejdź do kolejnego etapu dopiero, gdy technika pozostaje dobra, a objawy nie są wyraźnie gorsze po sesji ani następnego dnia.
Program dobiera fizjoterapeuta do badania i tolerancji pacjenta.