

Łokieć golfisty

1. tydzień - Etap wprowadzający - technika, tolerancja ruchu, mała/umiarkowana objętość.

Cel
Stopniowe zwiększenie tolerancji zginaczy i pronatorów przedramienia na chwyt i obciążenie.

Uwaga kliniczna
Przy drętwieniu IV-V palca lub wyraźnym osłabieniu dłoni różnicuj problem z nerwem łokciowym.

1 JOGA 1 Dłonie grzbietami przed klatką

Połącz grzbiety dłoni przed klatką piersiową i delikatnie opuszczaj łokcie, utrzymując komfort w nadgarstkach.

Dawka: 15-20 s x 2

Wskazówka: Bez mrowienia.

2 JOGA 2 Szczeniak z dłońmi na podwyższeniu

Oprzyj dłonie na krześle, cofnij biodra i wydłuż ramiona oraz boki tułowia.

Dawka: 20-30 s x 2

Wskazówka: Łokcie miękkie, bez przeprostu.

3 POZIOM 1 - łatwy Izometria zgięcia nadgarstka

Drugą dłonią staw opór stronie dłoniowej ręki bez wykonywania ruchu.

Dawka: 8-10 s x 6

Wskazówka: Siła umiarkowana.

4 POZIOM 2 - średni Powolne zgięcie nadgarstka bez ciężaru

Przedramię na stole, dłoń poza krawędzią. Zegnij i powoli wróć do neutralnej pozycji.

Dawka: 10-15 x 2-3

Wskazówka: Nie ściskaj palców.

5 POZIOM 3 - trudniejszy Pronacja i supinacja kontrolowana

Z łokciem przy tułowiu obracaj dłoń ku górze i ku dołowi w pełnym komfortowym zakresie.

Dawka: 10-15 x 2-3

Wskazówka: Ruch wolny, łokieć stabilny.

Zasada progresji: przejdź do kolejnego etapu dopiero, gdy technika pozostaje dobra, a objawy nie są wyraźnie gorsze po sesji ani następnego dnia.
Program dobiera fizjoterapeuta do badania i tolerancji pacjenta.