

Łokieć golfisty

+4. tydzień - Etap funkcjonalny - mniej podparcia, większa kontrola i tolerancja obciążenia.

Cel
Stopniowe zwiększenie tolerancji zginaczy i pronatorów przedramienia na chwyt i obciążenie.

Uwaga kliniczna
Przy drętwieniu IV-V palca lub wyraźnym osłabieniu dłoni różnicuj problem z nerwem łokciowym.

1

JOGA 1

Dłonie grzbietami przed klatką - wariant funkcjonalny

Połącz grzbiety dłoni przed klatką piersiową i delikatnie opuszczaj łokcie, utrzymując komfort w nadgarstkach. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 30-60 s x 2-3

Wskazówka: Bez mrowienia. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

2

JOGA 2

Szczeniak z dłońmi na podwyższeniu - wariant funkcjonalny

Oprzyj dłonie na krześle, cofnij biodra i wydłuż ramiona oraz boki tułowia. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 30-60 s x 2-3

Wskazówka: Łokcie miękkie, bez przeprostu. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

3

POZIOM 1 - łatwy

Izometria zgięcia nadgarstka - wariant funkcjonalny

Drugą dłonią staw opór stronie dłoniowej ręki bez wykonywania ruchu. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 8-15 powt. x 2-4 serie

Wskazówka: Siła umiarkowana. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

4

POZIOM 2 - średni

Powolne zgięcie nadgarstka bez ciężaru - wariant funkcjonalny

Przedramię na stole, dłoń poza krawędzią. Zegnij i powoli wróć do neutralnej pozycji. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 8-15 powt. x 2-4 serie

Wskazówka: Nie ściskaj palców. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

5

POZIOM 3 - trudniejszy

Pronacja i supinacja kontrolowana - wariant funkcjonalny

Z łokciem przy tułowiu obracaj dłoń ku górze i ku dołowi w pełnym komfortowym zakresie. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 8-15 powt. x 2-4 serie

Wskazówka: Ruch wolny, łokieć stabilny. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

Zasada progresji: przejdź do kolejnego etapu dopiero, gdy technika pozostaje dobra, a objawy nie są wyraźnie gorsze po sesji ani następnego dnia.
Program dobiera fizjoterapeuta do badania i tolerancji pacjenta.