

Cieśń nadgarstka / nerw pośrodkowy

1. tydzień - Etap wprowadzający - technika, tolerancja ruchu, mała/umiarkowana objętość.

Cel
Zmniejszenie prowokacji objawów i utrzymanie łagodnego ślizgu nerwu pośrodkowego oraz ruchomości nadgarstka.

Uwaga kliniczna
Nasilające się drętwienie, zanik kłębu kciuka lub utrwalona słabość wymagają dalszej diagnostyki.

1 JOGA 1 Góra z otwartymi dłońmi

Stań swobodnie, ramiona wzdłuż tułowia, palce dłoni wydłużone i rozluźnione.

Dawka: 30-45 s x 2

Wskazówka: Nie utrzymuj nadgarstków w skrajnym zgięciu.

2 JOGA 2 Anjali Mudra - dłonie przed klatką

Złącz dłonie przed klatką na wysokości, która nie wywołuje parestezji.

Dawka: 20-30 s x 2

Wskazówka: Zmniejsz kąt w nadgarstku przy mrowieniu.

3 POZIOM 1 - łatwy Otwieranie i zamykanie dłoni

Naprzemiennie szeroko rozprostuj palce i lekko zamknij dłoń bez silnego ścisku.

Dawka: 15-20 x 2

Wskazówka: Ruch bez bólu.

4 POZIOM 2 - średni Ślizg nerwu pośrodkowego

Wykonuj stopniowe ustawienia dłoni, łokcia i barku jako płynny ślizg bez utrzymywania napięcia.

Dawka: 6-10 x 1-2

Wskazówka: Nie rozciągaj nerwu na końcu ruchu.

5 POZIOM 3 - trudniejszy Kontrola nadgarstka przy lekkim podporze

Oprzyj dłonie o ścianę i delikatnie przenoś ciężar przód-tył.

Dawka: 30-45 s x 2

Wskazówka: Przerwij przy nasileniu drętwienia.

Zasada progresji: przejdź do kolejnego etapu dopiero, gdy technika pozostaje dobra, a objawy nie są wyraźnie gorsze po sesji ani następnego dnia.
Program dobiera fizjoterapeuta do badania i tolerancji pacjenta.