

Cieśń nadgarstka / nerw pośrodkowy

+2. tydzień - Progresja - większa kontrola, nieco większy zakres lub dłuższy czas pracy.

Cel
Zmniejszenie prowokacji objawów i utrzymanie łagodnego ślizgu nerwu pośrodkowego oraz ruchomości nadgarstka.

Uwaga kliniczna
Nasilające się drętwienie, zanik kłębu kciuka lub utrwalona słabość wymagają dalszej diagnostyki.

1 JOGA 1 Góra z otwartymi dłońmi - progresja

Stań swobodnie, ramiona wzdłuż tułowia, palce dłoni wydłużone i rozluźnione. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 30-45 s x 2-3

Wskazówka: Nie utrzymuj nadgarstków w skrajnym zgięciu. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

2 JOGA 2 Anjali Mudra - dłonie przed klatką - progresja

Złącz dłonie przed klatką na wysokości, która nie wywołuje parestezji. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 30-45 s x 2-3

Wskazówka: Zmniejsz kąt w nadgarstku przy mrowieniu. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

3 POZIOM 1 - łatwy Otwieranie i zamykanie dłoni - progresja

Naprzemienne szeroko rozprostuj palce i lekko zamknij dłoń bez silnego ścisku. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 10-15 powt. x 2-3 serie

Wskazówka: Ruch bez bólu. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

4 POZIOM 2 - średni Ślizg nerwu w większym bezbolesnym zakresie

Wykonuj stopniowe ustawienia dłoni, łokcia i barku jako płynny ślizg bez utrzymywania napięcia. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 10-15 powt. x 2-3 serie

Wskazówka: Nie rozciągaj nerwu na końcu ruchu. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

5 POZIOM 3 - trudniejszy Kontrola nadgarstka przy lekkim podporze - progresja

Oprzyj dłonie o ścianę i delikatnie przenoś ciężar przód-tył. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 10-15 powt. x 2-3 serie

Wskazówka: Przerwij przy nasileniu drętwienia. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

Zasada progresji: przejdź do kolejnego etapu dopiero, gdy technika pozostaje dobra, a objawy nie są wyraźnie gorsze po sesji ani następnego dnia.
Program dobiera fizjoterapeuta do badania i tolerancji pacjenta.