

Cieśń nadgarstka / nerw pośrodkowy

Podtrzymanie - Utrzymanie efektu - mniejsza częstotliwość, dobra jakość i funkcjonalne warianty.

Cel
Zmniejszenie prowokacji objawów i utrzymanie łagodnego ślizgu nerwu pośrodkowego oraz ruchomości nadgarstka.

Uwaga kliniczna
Nasilające się drętwienie, zanik kłębu kciuka lub utrwalona słabość wymagają dalszej diagnostyki.

1 JOGA 1 Góra z otwartymi dłońmi - wariant podtrzymujący

Stań swobodnie, ramiona wzdłuż tułowia, palce dłoni wydłużone i rozluźnione. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 30-60 s x 1-2, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Nie utrzymuj nadgarstków w skrajnym zgięciu. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

2 JOGA 2 Anjali Mudra - dłonie przed klatką - wariant podtrzymujący

Złącz dłonie przed klatką na wysokości, która nie wywołuje parestezji. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 30-60 s x 1-2, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Zmniejsz kąt w nadgarstku przy mrowieniu. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

3 POZIOM 1 - łatwy Otwieranie i zamykanie dłoni - wariant podtrzymujący

Naprzemiennie szeroko rozprostuj palce i lekko zamknij dłoń bez silnego ścisku. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 8-12 powt. x 2 serie, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Ruch bez bólu. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

4 POZIOM 2 - średni Ślizg nerwu - dawka podtrzymująca

Wykonuj stopniowe ustawienia dłoni, łokcia i barku jako płynny ślizg bez utrzymywania napięcia. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 8-12 powt. x 2 serie, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Nie rozciągaj nerwu na końcu ruchu. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

5 POZIOM 3 - trudniejszy Kontrola nadgarstka przy lekkim podporze - wariant podtrzymujący

Oprzyj dłonie o ścianę i delikatnie przenoś ciężar przód-tył. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 8-12 powt. x 2 serie, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Przerwij przy nasileniu drętwienia. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

Zasada progresji: przejdź do kolejnego etapu dopiero, gdy technika pozostaje dobra, a objawy nie są wyraźnie gorsze po sesji ani następnego dnia.
Program dobiera fizjoterapeuta do badania i tolerancji pacjenta.