

Sztywność odcinka piersiowego / garb posturalny

1. tydzień - Etap wprowadzający - technika, tolerancja ruchu, mała/umiarkowana objętość.

Cel
Poprawa wyprost i rotacji odcinka piersiowego oraz pracy łopatek.

Uwaga kliniczna
Przy osteoporozie unikaj forsownego zgięcia i rotacji; ćwiczenia dobierz indywidualnie.

1 JOGA 1 Szczeniak - Uttana Shishosana

Z klęku podpartego przesun dłoń do przodu, pozostawiając biodra nad kolanami i wydłużając klatkę.

Dawka: 20-30 s x 2-3

Wskazówka: Nie zapadaj szyi.

2 JOGA 2 Kobra niska

Leżąc na brzuchu oprzyj przedramiona lub dłonie i unieś mostek, utrzymując ruch głównie w piersiowym odcinku.

Dawka: 15-25 s x 2-3

Wskazówka: Bez kompresji lędźwi.

3 POZIOM 1 - łatwy Otwieranie książki

Leżąc na boku obracaj górne ramię i klatkę do tyłu, kolana pozostają razem.

Dawka: 6-10/stronę x 2

Wskazówka: Ruch płynny.

4 POZIOM 2 - średni Wyprost piersiowy na oparciu

Usiądź, oprzyj górny odcinek pleców o krawędź oparcia i wykonaj łagodny wyprost.

Dawka: 8-12 x 2

Wskazówka: Nie odchylaj głowy gwałtownie.

5 POZIOM 3 - trudniejszy Wall angel

Plecy przy ścianie, przesuwaj ramiona w górę i w dół bez wypychania żeber.

Dawka: 8-12 x 2-3

Wskazówka: Zakres dostosuj do barków.

Zasada progresji: przejdź do kolejnego etapu dopiero, gdy technika pozostaje dobra, a objawy nie są wyraźnie gorsze po sesji ani następnego dnia.
Program dobiera fizjoterapeuta do badania i tolerancji pacjenta.