

Ból lędźwiowy nieswoisty

1. tydzień - Etap wprowadzający - technika, tolerancja ruchu, mała/umiarkowana objętość.

Cel
Utrzymanie ruchu, poprawa kontroli tułowia i stopniowy powrót do obciążeń dnia codziennego.

Uwaga kliniczna
Nie ma jednego kierunku ruchu dobrego dla wszystkich. Dobieraj ćwiczenia do reakcji objawów i funkcji.

1 JOGA 1 Kot-krowa

W klęku podpartym płynnie przechodź między łagodnym zgięciem i wyprostem kręgosłupa.
Dawka: 8-12 cykli
Wskazówka: Ruch bez forsowania.

2 JOGA 2 Pozycja dziecka - jeśli komfortowa

Cofnij biodra w kierunku pięt, ręce przed sobą i oddychaj spokojnie.
Dawka: 20-40 s x 2
Wskazówka: Pomiń, jeśli zgięcie nasila objawy.

3 POZIOM 1 - łatwy Przetaczanie miednicy

Leżąc na plecach wykonuj małe ruchy przodo- i tyłopochylenia miednicy.
Dawka: 10-15 x 2
Wskazówka: Bez mocnego dociskania pleców.

4 POZIOM 2 - średni Most biodrowy

Unieś biodra do linii tułowia i ud, utrzymując swobodny oddech.
Dawka: 8-12 x 2-3
Wskazówka: Nie przeprostuj lędźwi.

5 POZIOM 3 - trudniejszy Bird dog

Z klęku podpartego wyprostuj przeciwną rękę i nogę bez rotacji miednicy.
Dawka: 6-10/stronę x 2-3
Wskazówka: Zakres mniejszy przy bólu.

Zasada progresji: przejdź do kolejnego etapu dopiero, gdy technika pozostaje dobra, a objawy nie są wyraźnie gorsze po sesji ani następnego dnia.
Program dobiera fizjoterapeuta do badania i tolerancji pacjenta.