

Ból lędźwiowy nieswoisty

+4. tydzień - Etap funkcjonalny - mniej podparcia, większa kontrola i tolerancja obciążenia.

Cel
Utrzymanie ruchu, poprawa kontroli tułowia i stopniowy powrót do obciążeń dnia codziennego.

Uwaga kliniczna
Nie ma jednego kierunku ruchu dobrego dla wszystkich. Dobieraj ćwiczenia do reakcji objawów i funkcji.

1 JOGA 1 Kot-krowa + przejście do neutralnej stabilizacji

W kłku podpartym płynnie przechodź między łagodnym zgięciem i wyprostem kręgosłupa. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 30-60 s x 2-3

Wskazówka: Ruch bez forsowania. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

2 JOGA 2 Pozycja dziecka -> klęk podparty

Cofnij biodra w kierunku pięt, ręce przed sobą i oddychaj spokojnie. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 30-60 s x 2-3

Wskazówka: Pomiń, jeśli zgięcie nasila objawy. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

3 POZIOM 1 - łatwy Przetaczanie miednicy - wariant funkcjonalny

Leżąc na plecach wykonuj małe ruchy przodo- i tyłopochylenia miednicy. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 8-15 powt. x 2-4 serie

Wskazówka: Bez mocnego dociskania pleców. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

4 POZIOM 2 - średni Most z marszem naprzemiennym

Unieś biodra do linii tułowia i ud, utrzymując swobodny oddech. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 8-15 powt. x 2-4 serie

Wskazówka: Nie przeprostuj lędźwi. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

5 POZIOM 3 - trudniejszy Bird dog kolano-łokieć

Z kłku podpartego wyprostuj przeciwną rękę i nogę bez rotacji miednicy. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 8-15 powt. x 2-4 serie

Wskazówka: Zakres mniejszy przy bólu. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

Zasada progresji: przejdź do kolejnego etapu dopiero, gdy technika pozostaje dobra, a objawy nie są wyraźnie gorsze po sesji ani następnego dnia.
Program dobiera fizjoterapeuta do badania i tolerancji pacjenta.