

Stabilizacja miednicy / okolica SI

+4. tydzień - Etap funkcjonalny - mniej podparcia, większa kontrola i tolerancja obciążenia.

Cel
Poprawa kontroli obciążania miednicy i bioder w podporze obunóż i jednoonóż.

Uwaga kliniczna
Ból okolicy SI wymaga różnicowania z odcinkiem lędźwiowym, biodrem i innymi źródłami bólu.

1 JOGA 1

Wojownik I - krótki wykrok - wariant funkcjonalny

Ustaw krótki wykrok i utrzymaj miednicę skierowaną do przodu, bez zapadania tułowia. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 30-60 s x 2-3

Wskazówka: Obie stopy stabilne. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

2 JOGA 2

Most z marszem naprzemiennym

Unieś biodra i wykonaj spokojne 2-3 oddechy, potem powoli opuść. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 30-60 s x 2-3

Wskazówka: Bez bólu punktowego w okolicy SI. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

3 POZIOM 1 - łatwy

Naprzemienne odrywanie stopy w leżeniu - wariant funkcjonalny

W leżeniu z ugiętymi kolanami unieś jedną stopę kilka centymetrów i odstaw bez kołysania miednicą. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 8-15 powt. x 2-4 serie

Wskazówka: Miednica spokojna. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

4 POZIOM 2 - średni

Most z marszem naprzemiennym

W górze mostu odrywaj na zmianę jedną stopę minimalnie od podłoża. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 8-15 powt. x 2-4 serie

Wskazówka: Nie opadaj biodrem. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

5 POZIOM 3 - trudniejszy

Step-down z niskiego stopnia - wariant funkcjonalny

Stań na niskim stopniu i powoli opuszczaj drugą piętę do podłoża, kontrolując miednicę. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 8-15 powt. x 2-4 serie

Wskazówka: Kolano w osi stopy. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

Zasada progresji: przejdź do kolejnego etapu dopiero, gdy technika pozostaje dobra, a objawy nie są wyraźnie gorsze po sesji ani następnego dnia.
Program dobiera fizjoterapeuta do badania i tolerancji pacjenta.