

Stabilizacja miednicy / okolica SI

Podtrzymanie - Utrzymanie efektu - mniejsza częstotliwość, dobra jakość i funkcjonalne warianty.

Cel
Poprawa kontroli obciążania miednicy i bioder w podporze obunóż i jednonóż.

Uwaga kliniczna
Ból okolicy SI wymaga różnicowania z odcinkiem lędźwiowym, biodrem i innymi źródłami bólu.

1 JOGA 1 Wojownik I - krótki wykrok - wariant podtrzymujący

Ustaw krótki wykrok i utrzymaj miednicę skierowaną do przodu, bez zapadania tułowia. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 30-60 s x 1-2, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Obie stopy stabilne. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

2 JOGA 2 Most - 2 serie kontrolne 2-3x/tydz.

Unieś biodra i wykonaj spokojne 2-3 oddechy, potem powoli opuść. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 30-60 s x 1-2, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Bez bólu punktowego w okolicy SI. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

3 POZIOM 1 - łatwy Naprzemienne odrywanie stopy w leżeniu - wariant podtrzymujący

W leżeniu z ugiętymi kolanami unieś jedną stopę kilka centymetrów i odstaw bez kołysania miednicą. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 8-12 powt. x 2 serie, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Miednica spokojna. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

4 POZIOM 2 - średni Most - 2 serie kontrolne 2-3x/tydz.

W górze mostu odrywaj na zmianę jedną stopę minimalnie od podłoża. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 8-12 powt. x 2 serie, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Nie opadaj biodrem. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

5 POZIOM 3 - trudniejszy Step-down z niskiego stopnia - wariant podtrzymujący

Stań na niskim stopniu i powoli opuszczaj drugą piętę do podłoża, kontrolując miednicę. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 8-12 powt. x 2 serie, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Kolano w osi stopy. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

Zasada progresji: przejdź do kolejnego etapu dopiero, gdy technika pozostaje dobra, a objawy nie są wyraźnie gorsze po sesji ani następnego dnia.
Program dobiera fizjoterapeuta do badania i tolerancji pacjenta.