

Ból rzepkowo-udowy

1. tydzień - Etap wprowadzający - technika, tolerancja ruchu, mała/umiarkowana objętość.

Cel
Zwiększenie tolerancji kolana na zgięcie i obciążenie oraz poprawa siły biodra i uda.

Uwaga kliniczna
Ćwiczenia powinny być dozowane według 24-godzinnej reakcji objawów. Nie dąż do „ustawiania rzepki” na siłę.

1 JOGA 1 Krzesło - płytko

Cofnij biodra jak do siadania, ugnij kolana tylko do komfortowego zakresu i utrzymaj stopy stabilnie.

Dawka: 15-25 s x 2

Wskazówka: Kolana nad stopami.

2 JOGA 2 Wojownik II - płytki

Ugnij przednie kolano w małym zakresie, utrzymując oś biodro-kolano-stopą.

Dawka: 20-30 s/stronę x 2

Wskazówka: Nie zapadaj kolana do środka.

3 POZIOM 1 - łatwy Wyprost kolana w siadzie

Siedząc powoli wyprostuj kolano do tolerowanego zakresu i wróć.

Dawka: 10-15 x 2

Wskazówka: Ruch bez szarpania.

4 POZIOM 2 - średni Wstawanie z krzesła

Wstań i usiądź powoli, utrzymując kolana w osi stóp.

Dawka: 8-12 x 2-3

Wskazówka: Zaczynij od wyższego siedziska.

5 POZIOM 3 - trudniejszy Step-down

Z niskiego stopnia opuszczaj wolną piętę ku podłożu i wracaj.

Dawka: 6-10/stronę x 2-3

Wskazówka: Miednica i kolano stabilne.

Zasada progresji: przejdź do kolejnego etapu dopiero, gdy technika pozostaje dobra, a objawy nie są wyraźnie gorsze po sesji ani następnego dnia.
Program dobiera fizjoterapeuta do badania i tolerancji pacjenta.