

Ból rzepkowo-udowy

+2. tydzień - Progresja - większa kontrola, nieco większy zakres lub dłuższy czas pracy.

Cel
Zwiększenie tolerancji kolana na zgięcie i obciążenie oraz poprawa siły biodra i uda.

Uwaga kliniczna
Ćwiczenia powinny być dozowane według 24-godzinnej reakcji objawów. Nie dąż do „ustawiania rzepki” na siłę.

1 JOGA 1 Krzesło - dłuższe utrzymanie

Cofnij biodra jak do siadania, ugnij kolana tylko do komfortowego zakresu i utrzymaj stopy stabilnie. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 30-45 s x 2-3

Wskazówka: Kolana nad stopami. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

2 JOGA 2 Wojownik II z dłuższym utrzymaniem

Ugnij przednie kolano w małym zakresie, utrzymując oś biodro-kolano-stopą. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 30-45 s x 2-3

Wskazówka: Nie zapadaj kolana do środka. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

3 POZIOM 1 - łatwy Wyprost kolana w siadzie - progresja

Siedząc powoli wyprostuj kolano do tolerowanego zakresu i wróć. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 10-15 powt. x 2-3 serie

Wskazówka: Ruch bez szarpania. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

4 POZIOM 2 - średni Wstawanie z niższego krzesła

Wstań i usiądź powoli, utrzymując kolana w osi stóp. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 10-15 powt. x 2-3 serie

Wskazówka: Zaczynij od wyższego siedziska. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

5 POZIOM 3 - trudniejszy Step-down - progresja

Z niskiego stopnia opuszczaj wolną piętę ku podłożu i wracaj. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 10-15 powt. x 2-3 serie

Wskazówka: Miednica i kolano stabilne. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

Zasada progresji: przejdź do kolejnego etapu dopiero, gdy technika pozostaje dobra, a objawy nie są wyraźnie gorsze po sesji ani następnego dnia.
Program dobiera fizjoterapeuta do badania i tolerancji pacjenta.