

Ból rzepkowo-udowy

+4. tydzień - Etap funkcjonalny - mniej podparcia, większa kontrola i tolerancja obciążenia.

Cel
Zwiększenie tolerancji kolana na zgięcie i obciążenie oraz poprawa siły biodra i uda.

Uwaga kliniczna
Ćwiczenia powinny być dozowane według 24-godzinnej reakcji objawów. Nie dąż do „ustawiania rzepki” na siłę.

1 JOGA 1 Krzesło z wolnym wstawaniem i siadaniem

Cofnij biodra jak do siadania, ugnij kolana tylko do komfortowego zakresu i utrzymaj stopy stabilnie. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 30-60 s x 2-3

Wskazówka: Kolana nad stopami. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

2 JOGA 2 Wojownik II z płynnym przejściem przód-tył

Ugnij przednie kolano w małym zakresie, utrzymując oś biodro-kolano-stopą. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 30-60 s x 2-3

Wskazówka: Nie zapadaj kolana do środka. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

3 POZIOM 1 - łatwy Wyprost kolana w siadzie - wariant funkcjonalny

Siedząc powoli wyprostuj kolano do tolerowanego zakresu i wróć. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 8-15 powt. x 2-4 serie

Wskazówka: Ruch bez szarpania. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

4 POZIOM 2 - średni Wstawanie z asymetrycznym ustawieniem stóp

Wstań i usiądź powoli, utrzymując kolana w osi stóp. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 8-15 powt. x 2-4 serie

Wskazówka: Zaczynij od wyższego siedziska. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

5 POZIOM 3 - trudniejszy Step-down - wariant funkcjonalny

Z niskiego stopnia opuszczaj wolną piętę ku podłożu i wracaj. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 8-15 powt. x 2-4 serie

Wskazówka: Miednica i kolano stabilne. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

Zasada progresji: przejdź do kolejnego etapu dopiero, gdy technika pozostaje dobra, a objawy nie są wyraźnie gorsze po sesji ani następnego dnia.
Program dobiera fizjoterapeuta do badania i tolerancji pacjenta.