

Ból rzepkowo-udowy

Podtrzymanie - Utrzymanie efektu - mniejsza częstotliwość, dobra jakość i funkcjonalne warianty.

Cel
Zwiększenie tolerancji kolana na zgięcie i obciążenie oraz poprawa siły biodra i uda.

Uwaga kliniczna
Ćwiczenia powinny być dozowane według 24-godzinnej reakcji objawów. Nie dąż do „ustawiania rzepki” na siłę.

1 JOGA 1 Krzesło podtrzymujące 2-3x/tydz.

Cofnij biodra jak do siadania, ugnij kolana tylko do komfortowego zakresu i utrzymaj stopy stabilnie. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 30-60 s x 1-2, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Kolana nad stopami. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

2 JOGA 2 Wojownik II podtrzymujące

Ugnij przednie kolano w małym zakresie, utrzymując oś biodro-kolano-stopą. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 30-60 s x 1-2, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Nie zapadaj kolana do środka. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

3 POZIOM 1 - łatwy Wyprost kolana w siadzie - wariant podtrzymujący

Siedząc powoli wyprostuj kolano do tolerowanego zakresu i wróć. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 8-12 powt. x 2 serie, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Ruch bez szarpania. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

4 POZIOM 2 - średni Wstawanie - 2 serie 2-3x/tydz.

Wstań i usiądź powoli, utrzymując kolana w osi stóp. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 8-12 powt. x 2 serie, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Zacznij od wyższego siedziska. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

5 POZIOM 3 - trudniejszy Step-down - wariant podtrzymujący

Z niskiego stopnia opuszczaj wolną piętę ku podłożu i wracaj. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 8-12 powt. x 2 serie, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Miednica i kolano stabilne. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

Zasada progresji: przejdź do kolejnego etapu dopiero, gdy technika pozostaje dobra, a objawy nie są wyraźnie gorsze po sesji ani następnego dnia.
Program dobiera fizjoterapeuta do badania i tolerancji pacjenta.