

Ściągno Achillesa / łydka

+4. tydzień - Etap funkcjonalny - mniej podparcia, większa kontrola i tolerancja obciążenia.

Cel
Stopniowe zwiększenie siły i tolerancji ścięgna Achillesa oraz mięśni łydki.

Uwaga kliniczna
Nagły trzask, utrata odepchnięcia lub dodatni test Thompsona wymagają pilnej diagnostyki ruptury.

1 JOGA 1 Pies z głową w dół - łagodnie - wariant funkcjonalny

Unieś biodra, kolana mogą być ugięte, a pięty wysoko. Stopniowo wydłużaj łydki bez ostrego bólu. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 30-60 s x 2-3

Wskazówka: Bez sprężynowania. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

2 JOGA 2 Wykrok z tylną piętą na ziemi - wariant funkcjonalny

Stań w wykroku i delikatnie przenieś ciężar do przodu, utrzymując tylną piętę na podłożu. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 30-60 s x 2-3

Wskazówka: Rozciąganie łagodne. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

3 POZIOM 1 - łatwy Wspięcia jednonóż / większe obciążenie jednej nogi

Przy podparciu unieś obie pięty i powoli opuść. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 8-15 powt. x 2-4 serie

Wskazówka: Ruch spokojny. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

4 POZIOM 2 - średni Wspięcia jednonóż / większe obciążenie jednej nogi

Unieś pięty obunóż, przenieś nieco więcej ciężaru na jedną stronę podczas opuszczania. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 8-15 powt. x 2-4 serie

Wskazówka: Bez gwałtownego spadania pięty. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

5 POZIOM 3 - trudniejszy Wspięcia jednonóż / większe obciążenie jednej nogi

Przy lekkim podparciu wykonuj wspięcia na jednej nodze. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 8-15 powt. x 2-4 serie

Wskazówka: Zakres i tempo dostosuj do reakcji następnego dnia. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

Zasada progresji: przejdź do kolejnego etapu dopiero, gdy technika pozostaje dobra, a objawy nie są wyraźnie gorsze po sesji ani następnego dnia.
Program dobiera fizjoterapeuta do badania i tolerancji pacjenta.