

Ściągno Achillesa / łydka

Podtrzymanie - Utrzymanie efektu - mniejsza częstotliwość, dobra jakość i funkcjonalne warianty.

Cel
Stopniowe zwiększenie siły i tolerancji ścięgna Achillesa oraz mięśni łydki.

Uwaga kliniczna
Nagły trzask, utrata odepchnięcia lub dodatni test Thompsona wymagają pilnej diagnostyki ruptury.

1 JOGA 1 Pies z głową w dół - łagodnie - wariant podtrzymujący

Unieś biodra, kolana mogą być ugięte, a pięty wysoko. Stopniowo wydłużaj łydki bez ostrego bólu. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 30-60 s x 1-2, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Bez sprężynowania. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

2 JOGA 2 Wykrok z tylną piętą na ziemi - wariant podtrzymujący

Stań w wykroku i delikatnie przenieś ciężar do przodu, utrzymując tylną piętę na podłożu. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 30-60 s x 1-2, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Rozciąganie łagodne. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

3 POZIOM 1 - łatwy Wspięcia podtrzymujące 2-3x/tydz.

Przy podparciu unieś obie pięty i powoli opuść. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 8-12 powt. x 2 serie, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Ruch spokojny. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

4 POZIOM 2 - średni Wspięcia podtrzymujące 2-3x/tydz.

Unieś pięty obunóż, przenieś nieco więcej ciężaru na jedną stronę podczas opuszczania. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 8-12 powt. x 2 serie, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Bez gwałtownego spadania pięty. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

5 POZIOM 3 - trudniejszy Wspięcia podtrzymujące 2-3x/tydz.

Przy lekkim podparciu wykonuj wspięcia na jednej nodze. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 8-12 powt. x 2 serie, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Zakres i tempo dostosuj do reakcji następnego dnia. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

Zasada progresji: przejdź do kolejnego etapu dopiero, gdy technika pozostaje dobra, a objawy nie są wyraźnie gorsze po sesji ani następnego dnia.
Program dobiera fizjoterapeuta do badania i tolerancji pacjenta.