

Ból pięty / rozciągną podeszwowe

1. tydzień - Etap wprowadzający - technika, tolerancja ruchu, mała/umiarkowana objętość.

Cel
Poprawa tolerancji rozciągną podeszwowego i łydki na obciążenie oraz kontrola łuku stopy.

Uwaga kliniczna
Przy bólu pięty z drętwieniem, znacznym obrzękiem lub urazem różnicuj inne przyczyny.

1 JOGA 1 Pies z głową w dół z ugiętymi kolanami

Utrzymaj biodra wysoko, pięty uniesione i stopniowo prostuj kolana bez wywoływania ostrego bólu pięty.

Dawka: 20-30 s x 2

Wskazówka: Nie wymuszaj pięt na ziemi.

2 JOGA 2 Góra z aktywnym łukiem

Stań boso i utrzymaj trójnóg stopy, delikatnie unosząc łuk bez podwijania palców.

Dawka: 20-30 s x 3

Wskazówka: Palce rozluźnione.

3 POZIOM 1 - łatwy Rozciąganie palucha w siadzie

Założ nogę na nogę i delikatnie odciągnij paluch ku górze, czując napięcie pod stopą.

Dawka: 15-20 s x 3

Wskazówka: Bez ostrego bólu.

4 POZIOM 2 - średni Krótka stopa w staniu

Aktywuj łuk stopy bez zginania palców i utrzymaj kilka sekund.

Dawka: 5-8 s x 8-10

Wskazówka: Nacisk pod piętą i podstawami I/V śródstopia.

5 POZIOM 3 - trudniejszy Wspięcia z ręcznikiem pod palcami

Umieść zrolowany ręcznik pod palcami i wykonuj powolne wspięcia na palce.

Dawka: 8-12 x 2-3

Wskazówka: Zaczynij obunóż.

Zasada progresji: przejdź do kolejnego etapu dopiero, gdy technika pozostaje dobra, a objawy nie są wyraźnie gorsze po sesji ani następnego dnia.
Program dobiera fizjoterapeuta do badania i tolerancji pacjenta.