

Ból pięty / rozciągnio podeszwowe

+2. tydzień - Progresja - większa kontrola, nieco większy zakres lub dłuższy czas pracy.

Cel
Poprawa tolerancji rozciągnięcia podeszwowego i łydki na obciążenie oraz kontrola łuku stopy.

Uwaga kliniczna
Przy bólu pięty z drętwieniem, znacznym obrzękiem lub urazem różnicuj inne przyczyny.

1 JOGA 1 Pies z głową w dół z ugiętymi kolanami - progresja

Utrzymaj biodra wysoko, pięty uniesione i stopniowo prostuj kolana bez wywoływania ostrego bólu pięty. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 30-45 s x 2-3

Wskazówka: Nie wymuszaj pięt na ziemi. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

2 JOGA 2 Góra z aktywnym łukiem - progresja

Stań boso i utrzymaj trójnóg stopy, delikatnie unosząc łuk bez podwijania palców. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 30-45 s x 2-3

Wskazówka: Palce rozluźnione. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

3 POZIOM 1 - łatwy Rozciąganie palucha w siadzie - progresja

Założ nogę na nogę i delikatnie odciągnij paluch ku górze, czując napięcie pod stopą. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 10-15 powt. x 2-3 serie

Wskazówka: Bez ostrego bólu. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

4 POZIOM 2 - średni Krótka stopa w staniu

Aktywuj łuk stopy bez zginania palców i utrzymaj kilka sekund. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 10-15 powt. x 2-3 serie

Wskazówka: Nacisk pod piętą i podstawami I/V śródstopia. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

5 POZIOM 3 - trudniejszy Wspięcia z pauzą w górze

Umieść zrolowany ręcznik pod palcami i wykonuj powolne wspięcia na palce. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 10-15 powt. x 2-3 serie

Wskazówka: Zaczynaj obunóż. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

Zasada progresji: przejdź do kolejnego etapu dopiero, gdy technika pozostaje dobra, a objawy nie są wyraźnie gorsze po sesji ani następnego dnia.
Program dobiera fizjoterapeuta do badania i tolerancji pacjenta.