

Ból pięty / rozciągnio podeszwowe

Podtrzymanie - Utrzymanie efektu - mniejsza częstotliwość, dobra jakość i funkcjonalne warianty.

Cel
Poprawa tolerancji rozciągnięcia podeszwowego i łydki na obciążenie oraz kontrola łuku stopy.

Uwaga kliniczna
Przy bólu pięty z drętwieniem, znacznym obrzękiem lub urazem różnicuj inne przyczyny.

1 JOGA 1 Pies z głową w dół z ugiętymi kolanami - wariant podtrzymujący

Utrzymaj biodra wysoko, pięty uniesione i stopniowo prostuj kolana bez wywoływania ostrego bólu pięty. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 30-60 s x 1-2, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Nie wymuszaj pięt na ziemi. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

2 JOGA 2 Góra z aktywnym łukiem - wariant podtrzymujący

Stań boso i utrzymaj trójnóg stopy, delikatnie unosząc łuk bez podwijania palców. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 30-60 s x 1-2, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Palce rozluźnione. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

3 POZIOM 1 - łatwy Rozciąganie palucha w siadzie - wariant podtrzymujący

Założ nogę na nogę i delikatnie odciągnij paluch ku górze, czując napięcie pod stopą. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 8-12 powt. x 2 serie, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Bez ostrego bólu. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

4 POZIOM 2 - średni Krótka stopa podczas chodu i stania

Aktywuj łuk stopy bez zginania palców i utrzymaj kilka sekund. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 8-12 powt. x 2 serie, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Nacisk pod piętą i podstawami I/V śródstopia. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

5 POZIOM 3 - trudniejszy Wspięcia podtrzymujące 2-3x/tydz.

Umieść zrolowany ręcznik pod palcami i wykonuj powolne wspięcia na palce. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 8-12 powt. x 2 serie, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Zacznij obunóż. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

Zasada progresji: przejdź do kolejnego etapu dopiero, gdy technika pozostaje dobra, a objawy nie są wyraźnie gorsze po sesji ani następnego dnia.
Program dobiera fizjoterapeuta do badania i tolerancji pacjenta.