

Równowaga i stabilizacja

1. tydzień - Etap wprowadzający - technika, tolerancja ruchu, mała/umiarkowana objętość.

Cel
Poprawa kontroli postawy, reakcji równoważnych i pewności w podporze jednonóż.

Uwaga kliniczna
Zapewnij stabilne podparcie w zasięgu ręki. Przy częstych upadkach potrzebna jest pełna ocena ryzyka upadku.

1 JOGA 1 Góra - Tadasana

Stań boso lub w stabilnym obuwiu, ciężar rozłóż równo na stopach i utrzymuj wzrok na stałym punkcie.

Dawka: 30-60 s x 2

Wskazówka: Oddychaj swobodnie.

2 JOGA 2 Drzewo z podparciem

Stań przy ścianie, oprzyj stopę nogi wolnej o kostkę lub łydkę i utrzymaj pozycję.

Dawka: 15-30 s/stronę x 2

Wskazówka: Nie stawiaj stopy bezpośrednio na kolanie.

3 POZIOM 1 - łatwy Przenoszenie ciężaru bok-bok

Stań szerzej i powoli przenoś ciężar z jednej nogi na drugą bez unoszenia stóp.

Dawka: 10-15/stronę x 2

Wskazówka: Miednica nad stopą podporową.

4 POZIOM 2 - średni Stanie tandem

Ustaw jedną stopę przed drugą jak na linie i utrzymaj równowagę.

Dawka: 20-40 s x 2-3

Wskazówka: Podparcie ręką dostępne.

5 POZIOM 3 - trudniejszy Stanie jednonóż z sięganiem

Stań na jednej nodze i wykonuj drugą stopą lekkie sięgnięcia w przód, bok i tył.

Dawka: 5-8 kierunków/stronę x 2

Wskazówka: Ruch wolny i kontrolowany.

Zasada progresji: przejdź do kolejnego etapu dopiero, gdy technika pozostaje dobra, a objawy nie są wyraźnie gorsze po sesji ani następnego dnia.
Program dobiera fizjoterapeuta do badania i tolerancji pacjenta.