

Równowaga i stabilizacja

+2. tydzień - Progresja - większa kontrola, nieco większy zakres lub dłuższy czas pracy.

Cel
Poprawa kontroli postawy, reakcji równoważnych i pewności w podporze jednonóż.

Uwaga kliniczna
Zapewnij stabilne podparcie w zasięgu ręki. Przy częstych upadkach potrzebna jest pełna ocena ryzyka upadku.

1 JOGA 1 Góra - Tadasana - progresja

Stań boso lub w stabilnym obuwiu, ciężar rozłóż równo na stopach i utrzymuj wzrok na stałym punkcie. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 30-45 s x 2-3

Wskazówka: Oddychaj swobodnie. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

2 JOGA 2 Drzewo z podparciem - progresja

Stań przy ścianie, oprzyj stopę nogi wolnej o kostkę lub łydkę i utrzymaj pozycję. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 30-45 s x 2-3

Wskazówka: Nie stawiaj stopy bezpośrednio na kolanie. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

3 POZIOM 1 - łatwy Przenoszenie ciężaru + zatrzymanie

Stań szerzej i powoli przenieś ciężar z jednej nogi na drugą bez unoszenia stóp. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 10-15 powt. x 2-3 serie

Wskazówka: Miednica nad stopą podporową. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

4 POZIOM 2 - średni Stanie tandem - progresja

Ustaw jedną stopę przed drugą jak na linie i utrzymaj równowagę. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 10-15 powt. x 2-3 serie

Wskazówka: Podparcie ręką dostępne. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

5 POZIOM 3 - trudniejszy Stanie jednonóż z sięganiem - progresja

Stań na jednej nodze i wykonuj drugą stopą lekkie sięgnięcia w przód, bok i tył. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 10-15 powt. x 2-3 serie

Wskazówka: Ruch wolny i kontrolowany. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

Zasada progresji: przejdź do kolejnego etapu dopiero, gdy technika pozostaje dobra, a objawy nie są wyraźnie gorsze po sesji ani następnego dnia.
Program dobiera fizjoterapeuta do badania i tolerancji pacjenta.