

Chód / przenoszenie ciężaru / wysoki marsz

Podtrzymanie - Utrzymanie efektu - mniejsza częstotliwość, dobra jakość i funkcjonalne warianty.

Cel
Poprawa inicjacji kroku, obciążania kończyn i kontroli stopy podczas chodu.

Uwaga kliniczna
Przy chorobach neurologicznych dobierz objętość do zmęczenia, spastyczności i bezpieczeństwa. Nowy nagły deficyt wymaga diagnostyki.

1 JOGA 1 Góra z przenoszeniem ciężaru - wariant podtrzymujący

Stań stabilnie i powoli przesuwaj ciężar przód-tył oraz bok-bok w małym zakresie. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 30-60 s x 1-2, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Nie odrywaj stóp. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

2 JOGA 2 Wojownik II podtrzymujący

Stań szeroko przy blacie, ugnij jedną nogę i utrzymaj stabilne obciążenie obu stóp. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 30-60 s x 1-2, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Podparcie ręką dozwolone. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

3 POZIOM 1 - łatwy Marsz 2-3 min jako podtrzymanie

Trzymając się blatu unoś naprzemiennie kolana do wygodnej wysokości. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 8-12 powt. x 2 serie, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Tułów możliwie pionowo. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

4 POZIOM 2 - średni Krok w przód i powrót - wariant podtrzymujący

Z pozycji stojącej wykonaj krok w przód, przenieś ciężar na przednią nogę i wróć. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 8-12 powt. x 2 serie, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Pełny kontakt stopy z podłożem. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

5 POZIOM 3 - trudniejszy Chód po linii z zatrzymaniem - wariant podtrzymujący

Idź powoli po wyznaczonej linii, co kilka kroków zatrzymaj się i ustabilizuj. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 8-12 powt. x 2 serie, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Asekuracja według potrzeb. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

Zasada progresji: przejdź do kolejnego etapu dopiero, gdy technika pozostaje dobra, a objawy nie są wyraźnie gorsze po sesji ani następnego dnia.
Program dobiera fizjoterapeuta do badania i tolerancji pacjenta.