

Stopa po unieruchomieniu / po gipsie

+2. tydzień - Progresja - większa kontrola, nieco większy zakres lub dłuższy czas pracy.

Cel
Odzyskanie ruchomości stawu skokowego, kontroli stopy, siły łydki i pewnego obciążania po zakończeniu unieruchomienia.

Uwaga kliniczna
Zakres obciążania musi być zgodny z zaleceniem lekarza prowadzącego. Narastający obrzęk, zaczerwienienie lub ból łydki wymagają oceny.

1 JOGA 1 Pies z głową w dół - odciążony - progresja

Z podporu unieś biodra, pozostaw kolana ugięte i przenoś delikatnie ciężar między stopami. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 30-45 s x 2-3

Wskazówka: Bez forsowania pięty. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

2 JOGA 2 Góra z równym obciążeniem - progresja

Stań przy podparciu i stopniowo wyrównuj ciężar na obu stopach. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 30-45 s x 2-3

Wskazówka: Nie unikaj stopy, ale też nie przekraczaj zaleceń obciążania. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

3 POZIOM 1 - łatwy Alfabet stopą - progresja

Siedząc wykonuj stopą małe ruchy jak przy pisaniu liter alfabetu. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 10-15 powt. x 2-3 serie

Wskazówka: Ruch z kostki, nie całej nogi. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

4 POZIOM 2 - średni Kolano do ściany z większym zakresem

Przy pięcie na podłożu przesuwaj kolano w stronę ściany i wracaj. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 10-15 powt. x 2-3 serie

Wskazówka: Bez ostrego bólu. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

5 POZIOM 3 - trudniejszy Stanie jednonóż przy podparciu - progresja

Przenieś ciężar na leżącą nogę i utrzymaj równowagę przy ścianie lub blacie. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 10-15 powt. x 2-3 serie

Wskazówka: Nie progresuj, jeśli obrzęk wyraźnie narasta. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

Zasada progresji: przejdź do kolejnego etapu dopiero, gdy technika pozostaje dobra, a objawy nie są wyraźnie gorsze po sesji ani następnego dnia.
Program dobiera fizjoterapeuta do badania i tolerancji pacjenta.