

Stopa po unieruchomieniu / po gipsie

Podtrzymanie - Utrzymanie efektu - mniejsza częstotliwość, dobra jakość i funkcjonalne warianty.

Cel
Odzyskanie ruchomości stawu skokowego, kontroli stopy, siły łydki i pewnego obciążania po zakończeniu unieruchomienia.

Uwaga kliniczna
Zakres obciążania musi być zgodny z zaleceniem lekarza prowadzącego. Narastający obrzęk, zaczerwienienie lub ból łydki wymagają oceny.

1 JOGA 1 Pies z głową w dół - odciążony - wariant podtrzymujący

Z podporu unieś biodra, pozostaw kolana ugięte i przenoś delikatnie ciężar między stopami. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 30-60 s x 1-2, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Bez forsowania pięty. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

2 JOGA 2 Góra z równym obciążeniem - wariant podtrzymujący

Stań przy podparciu i stopniowo wyrównuj ciężar na obu stopach. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 30-60 s x 1-2, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Nie unikaj stopy, ale też nie przekraczaj zaleceń obciążania. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

3 POZIOM 1 - łatwy Alfabet stopą - wariant podtrzymujący

Siedząc wykonuj stopą małe ruchy jak przy pisaniu liter alfabetu. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 8-12 powt. x 2 serie, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Ruch z kostki, nie całej nogi. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

4 POZIOM 2 - średni Kolano do ściany kontrolnie przed treningiem

Przy pięcie na podłożu przesuwaj kolano w stronę ściany i wracaj. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 8-12 powt. x 2 serie, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Bez ostrego bólu. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

5 POZIOM 3 - trudniejszy Stanie jedno nogę przy podparciu - wariant podtrzymujący

Przenieś ciężar na leżącą nogę i utrzymaj równowagę przy ścianie lub blacie. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 8-12 powt. x 2 serie, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Nie progresuj, jeśli obrzęk wyraźnie narasta. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

Zasada progresji: przejdź do kolejnego etapu dopiero, gdy technika pozostaje dobra, a objawy nie są wyraźnie gorsze po sesji ani następnego dnia.
Program dobiera fizjoterapeuta do badania i tolerancji pacjenta.