

解析几何

November 9, 2018

3. 解: 设 $l_1 : \begin{cases} x = t \\ y = 1 + 2t \\ z = -3 - 2t \end{cases}$, 其方向矢量为 $\vec{v} = (1, 2, -2)$. 易知


$Q(0, 1, -3) \in l_1$. 设 Σ 是要求的柱面, 且 $P(x, y, z) \in \Sigma$, 那么

$$\frac{|\overrightarrow{PQ} \times \vec{v}|}{|\vec{v}|} = \frac{|\overrightarrow{MQ} \times \vec{v}|}{|\vec{v}|}.$$

所以得

$$(2x - y + 1)^2 + (2y + 2z + 4)^2 + (2x + z + 3)^2 = 65.$$

$$\text{即 } 8x^2 + 5y^2 + 5z^2 - 4xy + 8yz + 4xz + 16x + 14y + 22z - 39 = 0.$$



5解: (1). 回顾第33页习题5.

消去 x , 得关于 yOz 面的射影柱面: $z^4 + a^2y^2 - a^2z^2 = 0$,

消去 y , 得关于 xOz 面的射影柱面: $z^2 + ax = a^2$,

消去 z , 得关于 xOy 面的射影柱面: $x^2 + y^2 - ax = 0$.

(2). 设 Σ 是所求的柱面, $P(x, y, z) \in \Sigma$. 注意到曲线 C 的方程可写为

$$C: \begin{cases} ax + z^2 = a^2 \\ (x - \frac{a}{2})^2 + y^2 = \frac{a^2}{4} \end{cases},$$

则其参数方程为

$$C: \begin{cases} x = \frac{a}{2}(1 + \cos \theta) \\ y = \frac{a}{2} \sin \theta \\ z = \pm a \sin \frac{\theta}{2} \end{cases}.$$

所以要求的柱面方程为

$$\Sigma: \begin{cases} x = \frac{a}{2}(1 + \cos \theta) + lt, \\ y = \frac{a}{2} \sin \theta + mt, \\ z = \pm a \sin \frac{\theta}{2} + nt, \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}.$$

6.(3).解: 任取准线上一点 $P(x_1, y_1, z_1)$. $M(x, y, z)$ 为点 P 与定点连线上一点, 则有

$$\frac{x}{x_1} = \frac{y}{y_1} = \frac{z-2}{z_1-2}.$$

P 点在准线上, 则

$$\begin{cases} x_1^2 + y_1^2 + z_1^2 = 4y_1, \\ z_1 = 1 \end{cases}$$

联立方程, 消去 x_1, y_1, z_1 即得

$$x^2 + y^2 + (z-2)^2 = 4y(2-z).$$

即

$$x^2 + y^2 + z^2 + 4yz - 8y - 4z + 4 = 0.$$

7.(3).解: 设 $M(x, y, z)$ 是圆锥面上的任一点. 因为顶点是原点 O , 所以过 M 的直母线的方向矢量为 $\vec{\alpha} = (x, y, z)$. 已知球面的球心为 $O'(-1, 2, -2)$, 半径为 2. 所以外切锥面轴的方向矢量为 $\vec{n} = (-1, 2, -2)$, 记轴与母线的夹角为 θ , 则

$$\sin \theta = \frac{2}{\sqrt{1+4+4}} = \frac{2}{3}, \quad \cos \theta = \sqrt{1 - (\frac{2}{3})^2} = \frac{\sqrt{5}}{3}.$$

另一方面

$$\cos \theta = \frac{\vec{\alpha} \cdot \vec{n}}{|\alpha||\vec{n}|} = \frac{-x + 2y - 2z}{3\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}.$$

化简得:

$$4x^2 + y^2 + z^2 + 4xy - 4xz + 8yz = 0.$$

8. 解: 首先考虑包含三正半轴 $+x, +y, +z$ 的锥面. 设 $M(x, y, z)$ 是其上的任一点, 则过 M 的直母线的方向矢量为 $\vec{\alpha} = (x, y, z)$. 易知此锥面的轴的方向矢量为 $\vec{n} = (1, 1, 1)$. 记轴与母线的夹角为 θ , 则

$$\cos \theta = \frac{\vec{\alpha} \cdot \vec{n}}{|\alpha||\vec{n}|} = \frac{x + y + z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}\sqrt{3}}.$$

另一方面, 因为 x 正半轴在锥面上, 其方向矢量为 $\vec{v} = (1, 0, 0)$, 所以

$$\cos \theta = \frac{\vec{v} \cdot \vec{n}}{|\vec{v}||\vec{n}|} = \frac{1}{\sqrt{1+0+0}\sqrt{1+1+1}} = \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

所以化简得

$$xy + yz + xz = 0.$$

同理可知: 包含坐标轴 $+x, +y, -z$ 的圆锥面的方程为: $-xy + yz + xz = 0$;

包含坐标轴 $+x, -y, +z$ 的圆锥面的方程为: $xy + yz - xz = 0$;

包含坐标轴 $+x, -y, -z$ 的圆锥面的方程为: $-xy + yz - xz = 0$;

包含坐标轴 $-x, +y, +z$ 的圆锥面的方程为: $xy - yz + xz = 0$;

包含坐标轴 $-x, +y, -z$ 的圆锥面的方程为: $-xy - yz + xz = 0$;

包含坐标轴 $-x, -y, +z$ 的圆锥面的方程为: $xy - yz - xz = 0$;

包含坐标轴 $-x, -y, -z$ 的圆锥面的方程为: $-xy - yz - xz = 0$.

第57页习题:

9 解: (1). 设 $M(x, y, z)$ 为旋转曲面上任一点, 过 M 点的纬圆与直线 $l_2 : \frac{x}{1} = \frac{y}{-1} = \frac{z-1}{2}$ 交于点 $P(x_1, y_1, z_1)$. 过 P 点的纬圆为:


$$\begin{cases} (x - x_1) - (y - y_1) + 2(z - z_1) = 0 \\ x^2 + y^2 + (z - 1)^2 = x_1^2 + y_1^2 + (z_1 - 1)^2 \end{cases}.$$

又 P 点在直线 $l_1 : \frac{x}{2} = \frac{y}{2} = \frac{z-1}{-1}$ 上, 所以

$$\frac{x_1}{2} = \frac{y_1}{2} = \frac{z_1 - 1}{-1}.$$

从上面两方程消去参数 x_1, y_1, z_1 得

$$x^2 + y^2 + (z - 1)^2 = \frac{9}{4}(x - y + 2z - 2)^2$$



(4). 设 $M(x, y, z)$ 为旋转曲面上任一点, 过 M 点的纬圆与曲线交于点 $P(x_1, y_1, z_1)$. 过 P 点的纬圆为:


$$\begin{cases} z = z_1 \\ x^2 + y^2 + z^2 = x_1^2 + y_1^2 + z_1^2 \end{cases}.$$

又 P 点满足曲线方程

$$\begin{cases} z_1 = x_1^2 - y_1^2 \\ x_1^2 + y_1^2 - z_1^2 = 1 \end{cases}.$$

从上面的方程中消去参数 x_1, y_1, z_1 得旋转曲面的方程为

$$x^2 + y^2 - z^2 = 1$$



10. 解: 首先直线 l_2 可以写做 $\frac{x}{1} = \frac{y-1}{0} = \frac{z}{1}$, 则 l_2 的方向矢量为 $\vec{n}_2 = (1, 0, 1)$, 且过点 $A(0, 1, 0)$. 又直线 l_1 的方向矢量为 $\vec{n}_1 = (1, -1, 1)$, 且过点 $B(a, 0, 0)$. 因为 $l_1 \cap l_2 \neq \emptyset$, 所以有

$$(\vec{AB}, \vec{n}_1, \vec{n}_2) = (a, -1, 0) \times (1, -1, 1) \cdot (1, 0, 1) = 0$$

解得 $a = 0$.

所以 l_1 的方程为 $\frac{x}{1} = \frac{y}{-1} = \frac{z}{1}$. 设 $M(x, y, z)$ 为旋转曲面上任一点, 过 M 点的纬圆与曲线交于点 $P(x_1, y_1, z_1)$. 过 P 点的纬圆为:

$$\begin{cases} (x - x_1) - (y - y_1) + (z - z_1) = 0 \\ x^2 + y^2 + z^2 = x_1^2 + y_1^2 + z_1^2 \end{cases}.$$

又 P 点在直线 l_1 上, 即

$$\frac{x_1}{1} = \frac{y_1}{-1} = \frac{z_1}{1}$$

因此从上面的方程消去参数 x_1, y_1, z_1 得

$$x^2 + y^2 + z^2 + 2xy - 2xz + 2yz - 2x + 2y - 2z = 3.$$

(如果是按照 $l_1: \frac{x-a}{-1} = \frac{y}{-1} = \frac{z}{1}$ 来解题的话, 则易得 $a = -2$. 此时, 两条直线垂直, 曲面方程为: $x + y - z = 1$)

第62页习题

1.解: 设这个椭球面 Σ 满足

$$\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} + \frac{z^2}{c^2} = 1.$$

因为 $M(1, 2, \sqrt{23}) \in \Sigma$, 可以得

$$\frac{1}{9} + \frac{4}{16} + \frac{23}{c^2} = 1.$$

所以 $c^2 = 36$. 因此

$$\Sigma: \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} + \frac{z^2}{36} = 1.$$

2.解: 由已知, 可设椭圆抛物面的方程为

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 2z.$$

利用其过点 $(1, 2, 5), (\frac{1}{3}, -1, 1)$, 带入上面方程, 即得

$$a^2 = \frac{5}{18}, b^2 = \frac{5}{8}.$$

从而椭圆抛物面方程为

$$9x^2 + 4y^2 = 5z.$$

4.证明: 设 $\overrightarrow{OP_i} = r_i \vec{e}_i, i = 1, 2, 3$, 其中 $\{\vec{e}_i\}$ 是都单位向量, 且可用其方向余弦表示为

$$\begin{cases} \vec{e}_1 = \cos \alpha_1 \vec{i} + \cos \beta_1 \vec{j} + \cos \gamma_1 \vec{k} \\ \vec{e}_2 = \cos \alpha_2 \vec{i} + \cos \beta_2 \vec{j} + \cos \gamma_2 \vec{k} \\ \vec{e}_3 = \cos \alpha_3 \vec{i} + \cos \beta_3 \vec{j} + \cos \gamma_3 \vec{k} \end{cases} \quad (*)$$

因为 P_i 都在椭球面上，所以有

$$\frac{r_i^2 \cos^2 \alpha_i}{a^2} + \frac{r_i^2 \cos^2 \beta_i}{b^2} + \frac{r_i^2 \cos^2 \gamma_i}{c^2} = 1, i = 1, 2, 3.$$

那么可得

$$\frac{\sum_{i=1}^3 \cos^2 \alpha_i}{a^2} + \frac{\sum_{i=1}^3 \cos^2 \beta_i}{b^2} + \frac{\sum_{i=1}^3 \cos^2 \gamma_i}{c^2} = \sum_{i=1}^3 \frac{1}{r_i^2}.$$

另一方面，因为 $\{\vec{e}_i\}$ 互相垂直，那么 $(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3) = \pm 1$. 不失一般性，我们设 $(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3) = 1$. 那么由(*)式可解得

$$\begin{cases} \vec{i} = \cos \alpha_1 \vec{e}_1 + \cos \alpha_2 \vec{e}_2 + \cos \alpha_3 \vec{e}_3 \\ \vec{j} = \cos \beta_1 \vec{e}_1 + \cos \beta_2 \vec{e}_2 + \cos \beta_3 \vec{e}_3 \\ \vec{k} = \cos \gamma_1 \vec{e}_1 + \cos \gamma_2 \vec{e}_2 + \cos \gamma_3 \vec{e}_3 \end{cases}$$

因为 $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ 也是单位向量，所以

$$\sum_{i=1}^3 \cos^2 \alpha_i = \sum_{i=1}^3 \cos^2 \beta_i = \sum_{i=1}^3 \cos^2 \gamma_i = 1.$$

因此

$$\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} = \sum_{i=1}^3 \frac{1}{r_i^2}.$$