

练习 1. 假设 $f \in L^1([0, b])$, b 为一个正实数. 令

$$g(x) = \int_x^b \frac{f(t)}{t} dt, \quad 0 < x \leq b.$$

证明: $g \in L^1([0, b])$ 并且

$$\int_0^b g(x) dx = \int_0^b f(t) dt.$$

练习 2. 假设 F 是 \mathbb{R} 中的闭集, 其补集 F^c 测度有限. 令 $\delta(x)$ 记点 $x \in \mathbb{R}$ 到 F 的距离, 即

$$\delta(x) = \inf\{|x - y| : y \in F\}.$$

考虑如下函数

$$I(x) = \int_{\mathbb{R}} \frac{\delta(y)}{|x - y|^2} dy.$$

请回答下列问题.

- (a) 证明: $|\delta(x) - \delta(y)| \leq |x - y|$.
- (b) 证明: 如果 $x \notin F$, 则 $I(x) = \infty$.
- (c) 证明: $I(x) < \infty$ a.e. $x \in F$.

练习 3. 假设 f 是 \mathbb{R}^2 上的函数, 其定义如下:

$$f(x, y) = \begin{cases} a_n & \text{如果 } (x, y) \in [n, n+1) \times [n, n+1), \quad (n \geq 0), \\ -a_n & \text{如果 } (x, y) \in [n, n+1) \times [n+1, n+2), \quad (n \geq 0), \\ 0 & \text{其它.} \end{cases}$$

上述 $a_n = \sum_{k=0}^n b_k$, 而 $\{b_k\}$ 是一列正数且满足 $\sum_{k=0}^{\infty} b_k = s < \infty$. 请回答下列问题.

(a) 证明: 固定 $y \in \mathbb{R}$, 则 $f^y(\cdot) := f(\cdot, y) \in L^1(\mathbb{R})$; 固定 $x \in \mathbb{R}$, 则 $f_x(\cdot) := f(x, \cdot) \in L^1(\mathbb{R})$.

(b) 证明: $\int f_x(y)dy = 0$, 并且

$$\int f^y(x)dx = \begin{cases} a_0 & \text{如果 } 0 \leq y < 1, \\ a_n - a_{n-1} & \text{如果 } n \leq y < n+1 \quad (n \geq 1), \\ 0 & \text{如果 } y < 0. \end{cases}$$

由此进一步说明 $g(y) = \int f^y(x)dx$ 是关于 y 的可积函数.

(c) 回答问题并说明理由: $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 是发散的, 还是可能收敛的? (即: 以收敛的正项级数的前 n 项和为第 n 项的级数是否总是发散?)

练习 4. 假设 f 是 $[0, 1]$ 上的实值 (处处有限) 可测函数, 且 $|f(x) - f(y)|$ 在 $[0, 1] \times [0, 1]$ 上可积. 求证: $f \in L^1([0, 1])$.

练习 5. 考虑函数的卷积:

$$(f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x - y)g(y)dy.$$

(a) 证明: 假如 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$, g 为有界函数, 则 $f * g$ 一致连续.

(b) 证明: 在上一小题假设基础上, 如果 g 还是可积函数, 则 $(f * g)(x) \rightarrow 0$ (当 $|x| \rightarrow \infty$).