

§2

1. 求以下曲面的第二基本形式:

(1) 椭圆面 $\mathbf{r} = (a \cos \varphi \cos \theta, b \cos \varphi \sin \theta, c \sin \varphi)$

(2) 单叶双曲面 $\mathbf{r} = (a \cosh u \cos v, b \cosh u \sin v, c \sinh u)$

(3) 双叶双曲面 $\mathbf{r} = (a \cosh u, b \sinh u \cos v, c \sinh u \sin v)$

(4) 椭圆抛物面 $\mathbf{r} = (u, v, \frac{1}{2}(\frac{u^2}{a^2} + \frac{v^2}{b^2}))$

(5) 双曲抛物面 $\mathbf{r} = (a(u+v), b(u-v), 2uv)$

2. 写出曲面 $z = f(x, y)$ 的第一, 第二基本形式.

3. 应用行列式乘法法则, 证明:

$$(\mathbf{r}_{11}, \mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2)(\mathbf{r}_{22}, \mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = \begin{vmatrix} \mathbf{r}_{11} \cdot \mathbf{r}_{22} & \mathbf{r}_{11} \cdot \mathbf{r}_1 & \mathbf{r}_{11} \cdot \mathbf{r}_2 \\ \mathbf{r}_1 \cdot \mathbf{r}_{22} & E & F \\ \mathbf{r}_2 \cdot \mathbf{r}_{22} & F & G \end{vmatrix}$$

$$(\mathbf{r}_{12}, \mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2)^2 = \begin{vmatrix} \mathbf{r}_{12}^2 & \mathbf{r}_{12} \cdot \mathbf{r}_1 & \mathbf{r}_{12} \cdot \mathbf{r}_2 \\ \mathbf{r}_{12} \cdot \mathbf{r}_1 & E & F \\ \mathbf{r}_{12} \cdot \mathbf{r}_2 & F & G \end{vmatrix}$$

4. 证明: $LN - M^2 = \frac{1}{g}[(\mathbf{r}_{11}, \mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2)(\mathbf{r}_{22}, \mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) - (\mathbf{r}_{12}, \mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2)^2]$

5. 证明:

$$\mathbf{r}_{11} \cdot \mathbf{r}_1 = \frac{E_1}{2}, \quad \mathbf{r}_{12} \cdot \mathbf{r}_1 = \frac{E_2}{2}$$

$$\mathbf{r}_{22} \cdot \mathbf{r}_2 = \frac{G_2}{2}, \quad \mathbf{r}_{12} \cdot \mathbf{r}_2 = \frac{G_1}{2}$$

$$\mathbf{r}_{11} \cdot \mathbf{r}_2 = F_1 - \frac{E_2}{2}, \quad \mathbf{r}_{22} \cdot \mathbf{r}_1 = F_2 - \frac{G_1}{2}$$

§3

1. 证明:

(1) $g^{ij}g_{ji} = 2$

(2) $\frac{\partial \ln \sqrt{g}}{\partial u^i} = \Gamma_{1i}^1 + \Gamma_{2i}^2$

2. 证明: 当曲面的参数 u, v 变为 \bar{u}, \bar{v} 时, 第二基本形式的判别式

$$\bar{L}\bar{N} - \bar{M}^2 = \left[\frac{\partial(u, v)}{\partial(\bar{u}, \bar{v})} \right]^2 (LN - M^2)$$

3. 平面上取极坐标时, 线素为 $ds^2 = dr^2 + r^2 d\theta^2$, 计算 Γ_{ij}^k .

4. 用 E, F, G 及其偏导数表出联络系数 Γ_{ij}^k , 并算出 ω_i^j .

5. 计算曲面 $z = f(x, y)$ 的联络系数.

6. 用第一, 第二基本形式的系数表示下列混合积:

$$(\mathbf{n}, \mathbf{n}_1, \mathbf{r}_1), (\mathbf{n}, \mathbf{n}_1, \mathbf{r}_2), (\mathbf{n}, \mathbf{n}_2, \mathbf{r}_1), (\mathbf{n}, \mathbf{n}_2, \mathbf{r}_2)$$

7. 证明: 平移曲面 $\mathbf{r} = \mathbf{a}(u) + \mathbf{b}(v)$ 的参数曲线构成共轭网.

8. 证明: 椭圆抛物面 $\mathbf{r} = (u, v, \frac{1}{2}(\frac{u^2}{a^2} + \frac{v^2}{b^2}))$ 是平移曲面, 它可由抛物线 $z = \frac{x^2}{2a^2}, y = 0$ 沿着 $z = \frac{y^2}{2b^2}, x = 0$ 平行移动而得.

9. 证明: 曲面 $\mathbf{r} = (\cos u, \sin u + \sin v, \cos v)$ 的参数曲线都是圆, 并且构成共轭网.
10. 证明: 正螺面的渐近曲线就是它上面的直母线与螺线.
11. 求悬链面 $\mathbf{r} = (a \cosh \frac{t}{a} \cos \theta, a \cosh \frac{t}{a} \sin \theta, t)$ 上的渐近曲线.
12. 证明:
 - (1) 平面上的直线是平面上的渐近曲线;
 - (2) 可展平面上的渐近曲线(除脊线外)就是它的直母线;
 - (3) 若平面上每一点均有落在平面上的三条不同直线相交, 则此平面必为平面.
13. 证明: 每一条曲线在它的主法线平面上是渐近曲线.
14. 求双曲抛物面 $\mathbf{r} = (a(u+v), b(u-v), 2uv)$ 的渐近曲线.
15. 求旋转曲面 $\mathbf{r} = (f(t) \cos \theta, f(t) \sin \theta, t)$ 的渐近曲线.
16. 求曲面 $F(x, y, z) = 0$ 的渐近曲线应满足的方程.
17. 若曲面的参数曲线所构成的四边形对边长相等, 则称为Chebyshev网. 证明:
 - (1) 参数曲线构成Chebyshev网的充要条件是 $E_2 = G_1 = 0$.
 - (2) 当参数曲线取Chebyshev网时, 线素可取如下形式:

$$ds^2 = du^2 + 2 \cos \omega du dv + dv^2$$

其中 ω 为参数曲线的交角.

- (3) 证明平移曲面 $\mathbf{r} = \mathbf{a}(u) + \mathbf{b}(v)$ 的参数曲线构成Chebyshev网.

§4

1. 设在平面上, 曲线 C 的主法线与平面法线交角为 θ . 证明:

$$k_n = k \cos \theta$$

并在半径为 R 的球面上验证上述公式.

2. 证明: 曲线 C 为平面的渐近曲线的充要条件是: C 为直线, 或者 C 的密切平面与平面的切平面重合.
3. 设平面 S_1, S_2 的交线 C 的曲率为 k , 曲线 C 在 S_i 上的法曲率为 $k_i (i = 1, 2)$. S_1, S_2 的法线交角为 θ . 证明:

$$k^2 \sin^2 \theta = k_1^2 + k_2^2 - 2k_1 k_2 \cos \theta$$

4. 证明: 任何两个正交方向的法曲率之和为常数.
5. 证明: 平面上的点均为平点; 球面上的点均为圆点.
6. 求椭圆面的圆点, 并证明: 过原点而与圆点处切平面平行的平面截椭圆面于一圆.
7. 求曲面 $xyz = a^3$ 的脐点.
8. 对于曲面 $z = \frac{1}{2}(ax^2 + 2bxy + cy^2) + \cdots$ (a, b, c 为常数), 其中省略部分是 x, y 的三次以上项. 证明: 原点处的渐近方向由下式确定:

$$adx^2 + 2bdxdy + cdy^2 = 0$$

9. 设曲面方程的展开式为:

$$z = \frac{1}{2}(a_1x^2 + a_2y^2) + \frac{1}{3!}(b_1x^3 + 2b_2x^2y + 3b_3xy^2 + b_4y^3) + \cdots$$

证明: 在原点有

$$a_1 = k_1, a_2 = k_2, b_1 = \frac{\partial}{\partial x}k_1, b_2 = \frac{\partial}{\partial y}k_1, b_3 = \frac{\partial}{\partial x}k_2, b_4 = \frac{\partial}{\partial y}k_2$$

10. 证明: 可展曲面上的直母线既是渐近线又是曲率线, 它所对应的法曲率为零. 另一族曲率线为母线的正交轨线.

11. 设一曲率线(非渐近曲线)的密切平面与曲面的切平面交于定角, 则该曲率线必为平面曲线.

12. 证明: 曲面 S' (无脐点)上两族曲率线的法线曲面与 S 的平行曲面(由 S 的每一点法线上截取定长而得的曲面)构成三重正交系.

13. 求二阶直纹面上的曲率线.

14. 求旋转曲面 $\mathbf{r} = (f(t) \cos \theta, f(t) \sin \theta, t)$ 的曲率线.

15. 设曲面沿着曲率线 $C: \mathbf{r} = \boldsymbol{\rho}(s)$ 的法曲率 $k_n \neq 0$. 证明:

(1) C 的法线曲面 S_1 不是柱面;

(2) 若 S_1 为某曲线 C_1 的切线曲面, 则 $C_1: \mathbf{r}_1 = \boldsymbol{\rho}(s) + \frac{\mathbf{n}(s)}{k_n}$;

(3) 若 S_1 为锥面, 则 $\mathbf{r}_1 = \text{常向量}$ (即锥面顶点).

16. 求曲面 $F(x, y, z) = 0$ 的曲率线.

17. 证明: 在表面上的一点, 若 $K > 0$, 则不存在实的渐近方向; 若 $K < 0$, 则存在两个渐近方向, 且主方向平分两渐近方向所张成的角.

18. 证明: 直纹面的总曲率不可能为正.

19. 证明球面(半径为 a)的总曲率与平均曲率都是常数:

$$K = \frac{1}{a^2}, H = \frac{1}{a}$$

20. 求螺面 $\mathbf{r} = (u \cos v, u \sin v, u + v)$ 的总曲率与平均曲率.

21. 证明: $\mathbf{n}_1 \times \mathbf{n}_2 = K\sqrt{g}\mathbf{n}$

22. 设曲面上曲线的切向量与一个主方向夹角为 θ . 证明:

$$H = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} k_n d\theta$$

23. 设过曲面上一点有 m 条切线, 相邻两条之间交角为 $\frac{2\pi}{m}$. 设 $\rho_1, \rho_2, \dots, \rho_m$ 分别为曲面法线与这些切线所定平面截线的曲率半径. 证明: 当 $m > 2$ 时

$$H = \frac{1}{m} \left(\frac{1}{\rho_1} + \cdots + \frac{1}{\rho_m} \right)$$

24. 求双曲抛物面 $\mathbf{r} = (a(u+v), b(u-v), 2uv)$ 的主曲率.

25. 比较切线曲面上曲率线的曲率与曲面的主曲率.

26. 设三个函数 $x(u, v), y(u, v), z(u, v)$ 为微分方程

$$\frac{\partial^2 \theta}{\partial u \partial v} = A(u, v) \frac{\partial \theta}{\partial u} + B(u, v) \frac{\partial \theta}{\partial v}$$

的独立解, 且 $x^2 + y^2 + z^2$ 亦为方程的解. 证明: 曲面 $\mathbf{r} = (x(u, v), y(u, v), z(u, v))$ 的参数曲线为曲率线.

27. 证明: 三族相互正交的曲面交线必为所在曲面的曲率线(Dupin定理).

28. 求二次曲面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 的曲率线.

29. 表面上的椭圆点, 双曲点, 抛物点, 脐点是否等距不变的?

30. 证明:

- (1) 椭圆面, 双叶双曲面, 椭圆抛物面上的点均为椭圆点;
- (2) 单叶双曲面, 双曲抛物面上的点均为双曲点;
- (3) 锥面, 柱面上的点均为抛物点.

31. 求曲面 $\mathbf{r} = (u^3, v^3, u + v)$ 的抛物点轨迹.

32. 设旋转曲面的经线有水平切线. 证明这些切线上的切点都是抛物点.

33. 设曲面 $S: \mathbf{r} = \mathbf{r}(u, v)$ 上没有抛物点, 并设 S 的一个平行曲面为 $\bar{S}: \bar{\mathbf{r}} = \mathbf{r} + \lambda \mathbf{n}$ (λ 为常数). 证明: 可选取 \bar{S} 的法向量 $\bar{\mathbf{n}}$, 使 \bar{S} 的总曲率与平均曲率分别为

$$\bar{K} = \frac{K}{1 - 2\lambda H + \lambda^2 K}, \quad \bar{H} = \frac{H - \lambda K}{1 - 2\lambda H + \lambda^2 K}$$

34. 设曲面的第三基本形式 $\text{III} = e' du^2 + 2f' dudv + g' dv^2$. 证明:

- (1) $|K| = \sqrt{\frac{e'g' - f'^2}{EG - F^2}}$
- (2) $(LN - M^2)^2 = (EG - F^2)(e'g' - f'^2)$

35. 证明: 在曲面的渐近曲线(曲率不为零)上, $|\tau| = \sqrt{-K}$, 这里 K 是曲面的总曲率.

36. 证明: 曲面为球面或平面的充要条件是 $H^2 = K$.

37. 证明: 若曲面的所有曲线均为曲率线, 则它为全脐点的曲面.

38. 证明: 若曲面与其Gauss映照的像成共形对应, 则曲面必为球面或极小曲面.

39. 求总曲率为零的旋转曲面.

40. 证明: 若平移曲面 $\mathbf{r} = \mathbf{a}(u) + \mathbf{b}(v)$ 的参数曲线构成正交网, 则必为柱面.

41. 证明: 若曲面在某一参数表示下, E, F, G, L, M, N 均为常数, 则曲面为柱面.

42. 证明: 正螺面 $\mathbf{r} = (u \cos v, u \sin v, bv)$ 为极小曲面, 并证明除平面外, 直纹极小曲面都是正螺面.

43. 证明: 若劈锥曲面 $\mathbf{r} = (u \cos v, u \sin v, \varphi(v))$ 是极小曲面, 则它必是正螺面.

44. 证明: $z = c \arctan \frac{y}{x}$ 是极小曲面.

45. 若 $z = f(x) + g(y)$ 是极小曲面. 证明: 除相差一个常数外, 它可写成

$$az = \ln \frac{\cos ay}{\cos ax} \quad (\text{Scherk 曲面})$$

46. 证明: 曲面 $\mathbf{r} = (3u(1+v^2) - u^3, 3v(1+u^2) - v^3, 3(u^2 - v^2))$ 是极小曲面(Enneper 曲面), 并证明它的曲率线是平面曲线, 求出曲率线所在的平面.

47. 证明: 曲面为极小曲面的充要条件是: 曲面上存在两族正交的渐近曲线.