

解析几何

2019-1-11

作业(12) (P121: 1,2, 5, 6; P125: 1, 3; P132: 1.)

第121页习题

1.解: 取代表元 $y^* = a(1, -1, 2), z^* = b(3, 2, 1)$, 使得

$$(0, -1, 1) = a(1, -1, 2) + b(3, 2, 1).$$

解得 $a = \frac{3}{5}, b = -\frac{1}{5}$. 直接计算得

$$(5, 2, 3) = \frac{4}{3}y^* + (-7)z^*.$$

即得 $(5, 2, 3)$ 的射影坐标为 $[(\frac{4}{3}, -7)]$.

取代表元 $\bar{y}^* = c(1, 1, 0), \bar{z}^* = d(-1, 2, -3)$, 使得

$$(1, -3, 4) = c(1, 1, 0) + d(-1, 2, -3).$$

解得 $c = -\frac{1}{3}, d = -\frac{4}{3}$. 再由

$$y^* = -\frac{3}{5}\bar{y}^* + \frac{3}{10}\bar{z}^*, \quad z^* = \frac{8}{5}\bar{y}^* - \frac{1}{20}\bar{z}^*.$$

可知坐标系的关系方程为

$$\begin{cases} \rho\bar{\lambda} = -\frac{3}{5}\lambda + \frac{8}{5}\mu \\ \rho\bar{\lambda} = \frac{3}{10}\lambda - \frac{1}{20}\mu \end{cases} \quad \rho \neq 0$$

2证明:

假设直线上取定了代表元 y^*, z^* , 则只需重新取代表元 \bar{y}^*, \bar{z}^* , 使得点 x^* 关于 y^* 和 z^* 的坐标为 (λ, μ) , 而关于 \bar{y}^*, \bar{z}^* 的坐标恰好为 $(\bar{\lambda}, \bar{\mu})$. 设 $x^* = \lambda y^* + \mu z^*$, 由(5.3.6)可得

$$x^* = (y^*, z^*) \begin{bmatrix} \lambda \\ \mu \end{bmatrix} = (y^*, z^*) A^{-1} \begin{bmatrix} \bar{\lambda} \\ \bar{\mu} \end{bmatrix}.$$

这里, 矩阵 $A = \{a_{ij}\}$

$$A^{-1} = (\det A)^{-1} \begin{bmatrix} a_{22} & -a_{12} \\ -a_{21} & a_{11} \end{bmatrix}.$$

从而取

$$\bar{y}^* = (\det A)^{-1}(a_{22}y^* - a_{12}z^*), \quad \bar{z}^* = (\det A)^{-1}(-a_{21}y^* + a_{11}z^*)$$

即可.

5 解: 令

$$(0, 1, 7) = a(1, 2, 1) + b(1, 1, 0) + c(2, 1, 1).$$

即得

$$\begin{cases} a + b + 2c = 0, \\ 2a + b + c = 1, \\ a + c = 7. \end{cases}$$

解得

$$a = 4, \quad b = -10, \quad c = 3.$$

即得 $(1, 1, 1)$ 的坐标为 $[(\frac{1}{8}, \frac{1}{20}, \frac{1}{6})]$.

6 解: 记

$$\begin{pmatrix} \xi'_1 \\ \xi'_2 \\ \xi'_3 \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \\ \xi_3 \end{pmatrix} \quad \text{其中矩阵 } A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 4 & 2 & -6 \\ 1 & 1 & -3 \end{bmatrix}.$$

利用

$$0 = (\xi'_1, \xi'_2, \xi'_3)(x'_1, x'_2, x'_3)^T = (\xi_1, \xi_2, \xi_3)A^T(x'_1, x'_2, x'_3)^T.$$

另一方面有

$$0 = (\xi_1, \xi_2, \xi_3)(x_1, x_2, x_3)^T.$$

解得 $(x_1, x_2, x_3)^T = A^T(x'_1, x'_2, x'_3)^T$, 即

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 1 & -6 & -3 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ x'_3 \end{pmatrix}$$

这是逆变换, 诱导的坐标变换为

$$\begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ x'_3 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{7}{4} & \frac{3}{4} \\ -1 & -4 & -2 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}.$$

第125页习题

1解: 用代数形式表达出来就是:

Desargues 定理: 若 $|x \times x', y \times y', z \times z'| = 0$, 则

$$|(y \times z) \times (y' \times z'), (z \times x) \times (z' \times x'), (x \times y) \times (x' \times y')| = 0.$$

对偶命题: 若 $|\xi \times \xi', \eta \times \eta', \zeta \times \zeta'| = 0$, 则

$$|(\eta \times \zeta) \times (\eta' \times \zeta'), (\zeta \times \xi) \times (\zeta' \times \xi'), (\xi \times \eta) \times (\xi' \times \eta')| = 0.$$

3证明: 设点 a, b, c 的射影坐标分别为 $[(0, 1, 0)], [(0, 0, 1)], [(0, 1, 1)]$, 点 x 为 $[(1, 0, 0)]$. 则直线

$$\xi = [(0, 0, 1)], \quad \eta = [(0, 1, 0)], \quad \zeta = [(0, 1, -1)].$$

可得第四调和线 $\varphi = [(0, 1, 1)]$, 即得

$$d = \alpha \times \varphi = [(1, 0, 0)] \times [(0, 1, 1)] = [(0, 1, -1)].$$

注意到 a, b, c, d 都在直线 $\alpha = [(1, 0, 0)]$ 上, 即知 d 是 a, b, c 的第四调和点.

第132页习题

1解: 设点 $z = \lambda_1 x + \lambda_2 y$, $w = \mu_1 x + \mu_2 y$, w 的坐标为 (x_1, x_2, x_3) . 则直接计算得

$$\lambda_1 = 2, \quad \lambda_2 = -6.$$

又由 $R(x, y; z, w) = \frac{\mu_1 \lambda_2}{\mu_2 \lambda_1} = -4$, 可得

$$w = (4, 19, 7).$$