Polypores


Les polypores sont un groupe défini par des spores formées sur un hyménium disposé à l'intérieur de tubes orientés vers le bas. Ces tubes sont normalement inséparables les uns des autres et de la chair du chapeau. Les pores (embouchures des tubes) peuvent être sphériques, anguleux, étirés, labyrinthiques ou en forme de lames. Le nombre de pores par millimètre est un caractère important à évaluer à l'aide d'une règle translucide et d'une loupe. Le bord des pores est stérile. Les carpophores peuvent être appliqués sur le substrat ou développer des chapeaux ± bien formés, et parfois aussi un pied ; ils peuvent être tendres et annuels ou coriaces à dures, et dans certains cas vivaces. On reconnaît les carpophores pérennes au fait qu'ils ont généralement plusieurs couches de tubes et des zones de croissance sur leurs chapeaux.

Tous les polypores sont des *Basidiomycota* à basides unicellulaires. Seul *Aporpium* (page 1186) est un champignon gélatineux à basides divisées longitudinalement. La plupart des espèces coriaces ou dures possèdent, outre des hyphes génératrices, des hyphes ligatives et/ou des hyphes squelettiques (page 35). Les carpophores à deux types d'hyphes sont dimitiques, et ceux à trois types sont trimitiques.

Presque tous les polypores sont des saprophytes et poussent en général sur bois. Ils produisent une carie (ou pourriture) brune ou blanche (page 14). Quelques espèces sont mycorhiziennes, par exemple *Albatrellus* & *Scutiger* (page 828) et *Coltricia* (page 843).

Autres champignons semblables :
– les bolets ont une chair tendre, et leurs tubes peuvent souvent être détachés de la chair du chapeau ; la plupart sont mycorhiziens (page 760).
– les corticioïdes mérulioïdes ont un hyménophore ± plissé entièrement fertile (page 974).
– les cyphelloïdes sont de petits *Basidiomycota* en coupe. Ils peuvent pousser en colonie et imiter alors un polypore (page 1076).

Bibliographie : 17, 37, 161, 163, 193, 219, 220, 235, 282, 283, 308, 309, 339, 356, 366, 367.



Polypores stipités

Ce groupe morphologique comprend les polypores ayant des carpophores ± bolétoïdes et ceux allongés en forme de langue, qui peuvent avoir un pied latéral court. Tous sont annuels. Dans le genre *Fistulina*, les tubes ne sont pas soudés entre eux. La plupart des espèces produisent des spores hyalines et lisses, mais quelques-unes ont des spores brunes et ornementées. Le genre *Pelloporus* possède des soies brunes et proéminentes.


Le groupe comprend à la fois des ectomycorhiziens, par exemple *Albatrellus*, *Scutiger* et *Coltricia*, des décomposeurs de l'humus, par exemple *Xanthoporus*, et des décomposeurs lignicoles qui produisent une carie (ou pourriture) blanche ou brune.

Autres champignons semblables :
– les bolets à tubes décurrents ont une chair tendre et en général des tubes qui se détachent facilement de la chair du chapeau. Les *Gyrodon* ont des tubes non séparables de la chair du chapeau, mais ils bleuissent au toucher (pages 760 & 795).
– chez les polypores en touffes ou en colonies, les chapeaux individuels possèdent aussi un pied (page 846).
– les polypores largement adnés qui poussent sur le dessus des souches et des troncs forment parfois une base contractée qui évoque un pied, mais on observe en général plus de carpophores « normaux » alentour (pages 854 & 886).

Voir également l'aperçu général et la bibliographie à la page 824.

Microscopie : spores, cystides et soies.

Le nombre approximatif d'espèces s'applique à l'Europe tempérée.



Polypores fasciculés

Ce groupe comprend des polypores à chapeaux nombreux issus d'une base commune étroite ou d'un pied épais et court. Tous forment des carpophores annuels à chair plutôt tendre et sont typiquement parasites des arbres.

Un certain nombre d'entre eux sont consommés, par exemple *Grifola*, *Cladomeris umbellatus*, *Laetiporus* et *Fistulina*, plus rarement *Meripilus*. *Phaeolus schweinitzii* est utilisé pour la teinture de la laine. Le *Laetiporus* est connu pour provoquer une légère intoxication lorsqu'il est insuffisamment cuit.

Autres champignons semblables :
– les polypores stipités sont semblables, mais ont un seul chapeau ou juste quelques-uns (page 826).
– les polypores pérennes largement adnés peuvent former des chapeaux superposés, mais ils ne sont pas issus d'un pied ou d'une base commune (pages 854 & 886).
– les *Sparassis* et champignons semblables n'ont pas de pores (page 952).

Voir également l'aperçu général et la bibliographie à la page 824.

Microscopie : spores et cystides.
cyst. = cystides.
b. = boucles.

Le nombre approximatif d'espèces s'applique à l'Europe tempérée.

Meripilus
1 espèce
page 850

Grifola
1 espèce
page 849

Bondarzewia
1 espèce
page 851

Abortiporus
1 espèce
page 852

Cladomeris
1 espèce
page 849

Buglossoporus
(voir page 832)

couleur de la chair

CARIE BLANCHE
CARIE BRUNE

les **polypores fasciculés** forment de nombreux chapeaux issus d'une base commune

b. -
cyst.
I+
b. -
cyst.
CARIE BLANCHE
CARIE BRUNE
cyst.
b. -
cyst.
b. -

autres champignons semblables

polypores largement adnés
pages 854 & 886

Phaeolus
1 espèce
page 853

Laetiporus
2+ espèces
page 848

Fistulina
(voir page 845)

polypores stipités
page 826

***Sparassis* et champignons semblables**
page 952

Polypores pérennes

Tous les polypores dont les carpophores produisent de nouvelles couches tubulaires au fil des années appartiennent à ce groupe. Les périodes de croissance sont souvent visibles comme autant de zones concentriques surélevées sur les chapeaux. Le groupe comprend la plupart des polypores à chair très coriace. En général, ils ont une seule période de croissance annuelle, mais *Fomes fomentarius* en présente deux : une importante au printemps et une plus faible à l'automne ; ceci crée deux zones de croissance par an.

Certaines espèces sont accidentellement pérennes. Ainsi, les *Trametes*, *Cerrena* et *Antrodia* peuvent, au cours d'un printemps doux, continuer à croître et ainsi produire des carpophores à deux couches. Cependant, ils pourrissent généralement durant l'été.

La plupart des polypores pérennes ont un système d'hyphes compliqué, avec des hyphes génératrices cloisonnées et des hyphes ramifiées et/ou des hyphes squelettiques à paroi épaisse sans cloison (page 35).


Les espèces peuvent être séparées en agents de caries (pourritures) blanches et de caries brunes ; bien que les deux types puissent paraître étonnamment similaires, ils ne sont pas étroitement liés.

Autres champignons semblables :
– les polypores semblables mais annuels sont divisés en deux groupes : ceux qui ont des chapeaux (pileés) et ceux qui n'en ont pas (résupinés) ; pages 886 et 932.

Voir également l'aperçu général et les références bibliographiques à la page 824.

Microscopie :
spores, cystides et soies.
b. = boucles.

Le nombre approximatif d'espèces s'applique à l'Europe tempérée.



Polypores piléés annuels

Ce groupe comprend les polypores réfléchis et piléés aux carpophores tendres ou coriaces, mais jamais durs, qui pourrissent après la saison. Toutes les espèces avec ou sans pied et à chair tendre appartiennent à ce groupe.

Suite page suivante…

Microscopie : spores et cystides. b. = boucles.

Nombre approximatif d'espèces en Europe tempérée.

Tyromyces* & *Loweomyces
6 espèces
page 908

Datronia
2 espèces
page 911

Abortiporus
(voir page 852)

Spongipellis
3 espèces
page 906

Odoria* & *Aurantiporus
2 espèces
pages 904 & 905

Daedaleopsis
2 espèces
page 910

Bjerkandera
2 espèces
page 912

Climacocystis
1 espèce
page 903

Trichaptum
4 espèces
page 914

Skeletocutis
13+ espèces
page 901

Cerrena
(voir page 860)

Gloeoporus
1 espèce
page 900

Dichomitus
(voir page 859)

Diplomitoporus
2 espèces
page 900

Funalia
2 espèces
page 916

Antrodiella
17+ espèces
page 898

Frantisekia
1 espèce
page 917

Antrodia*, *Cartilosoma* & *Neoantrodia
15+ espèces
page 896

Trametopsis
1 espèce
page 917

Amaropostia, Calcipostia, Fuscopostia, Oligoporus, Postia* & *Spongioporus
15+ espèces
page 891

Buglossoporus
(voir page 832)

Trametes
9 espèces
page 918

Amylocystis
1 espèce
page 890

Leptoporus
1 espèce
page 890

groupes semblables

corticioïdes piléés
page 962

polypores pérennes piléés
page 854

chair orangée à brun sombre
voir page suivante

chair blanche, crème, beige-rose pâle ou bleu pâle

polypores piléés annuels à chapeau largement adné, et chair tendre à coriace ; sur bois

CARIE BLANCHE

CARIE BRUNE

b. ±

I+

b. -

moyennement larges ; surtout sur feuillus

peu larges ; face supérieure sombre ; sur feuillus

moyennement larges ; pores labyrinthiques et rougissants ; sur feuillus

larges ; pores allongés et rougissants ; sur feuillus

larges ; pores ± labyrinthiques ; sur feuillus

larges ; chair tendre rougeâtre avec KOH ; sur feuillus

large ; feutré-hirsute ; sur conifères

peu larges ; cristaux sur les hyphes ; sur feuillus et conifères

peu larges pores rosâtres ; élastique ; sur feuillus

peu larges, pores assez larges ; sur conifères

peu larges ; très coriaces

peu larges ; coriaces ou tendres

moyennement larges ; tendres

large ; en forme de langue ; sur chênes

moyennement large ; rougissant ; sur conifères, boréal

moyennement large ; chair tendre et rougissante ; sur conifères, boréal

moyennement larges ; pores gris ou ligne brune ; sur feuillus

peu larges ; teinte violacée et pores irréguliers

moyennement larges ; pores labyrinthiques gris pâle

peu larges ; marge sombre ; en hauteur sur chênes et *Corylus*

moyennement larges ; très feutrés et à pores larges

moyennement larges ; teintes jaunâtres et pores petits

moyennement larges ; pores larges et déchirés en dents

peu larges à larges ; face supérieure très zonée, souvent feutrée ; pores petits à grands, arrondis ou étirés

Polypores piléés annuels

… suite de la page précédente.


Certains polypores annuels peuvent être formés uniquement d'hyphes génératrices et sont dits monomitiques ; les carpophores sont généralement mous et faciles à déchirer. Lorsque des hyphes squelettiques ou des hyphes ligatives sont également présentes, les carpophores sont dits dimitiques ; si les trois types d'hyphes sont présents, ils sont dits trimitiques. Les fructifications annuelles dimitiques et trimitiques sont généralement dures et coriaces (voir page 35 pour plus d'informations sur les systèmes d'hyphes).

Autres champignons semblables :
– les polypores piléés pérennes et largement adnés forment plusieurs couches de tubes au fil des années. Ils ont aussi souvent des zones surélevées en surface (page 854).
– les polypores fasciculés sont annuels et forment de nombreux chapeaux portés par un pied commun (page 846).
– les corticioïdes piléés n'ont pas de pores ; un examen à la loupe est parfois indispensable (page 962).

Voir également l'aperçu général et la bibliographie à la page 824.

Microscopie :
spores et cystides ou soies.
b. = boucles.

Le nombre approximatif d'espèces s'applique à l'Europe tempérée.



Polypores résupinés annuels

Ce groupe comprend les polypores à carpophores annuels et plats, complètement dépourvus de chapeau. Certaines espèces peuvent cependant former de petites protubérances sans surface évidente. Bien que certaines espèces puissent être identifiées sur le terrain, une identification correcte nécessite dans la majeure partie des cas un examen au microscope. De nombreuses espèces ont des carpophores résistants et durables qui persistent longtemps après que la production de spores a cessé.

Les individus stériles ne peuvent pas être identifiés. Il est donc important de vérifier si le spécimen est capable de déposer des spores sur une lame de microscope. Gardez le spécimen humide afin d'augmenter les chances d'obtenir une bonne sporée.

Toutes les espèces dégradent le bois et la plupart produisent une carie (ou pourriture) blanche.

Autres champignons semblables :
– les polypores annuels réfléchis (polypores avec une partie inférieure résupinée décurrente) et les polypores pileés (page 886).
– les polypores résupinés pérennes (page 854).
– les corticioïdes mérulioïdes (corticioïdes avec un hyménophore plissé-veiné) peuvent ressembler mais leurs « pores » sont arrondis et fertiles, alors que chez les véritables polypores les embouchures des pores sont stériles (page 974).
– les cyphelloïdes grégaires peuvent rappeler les polypores résupinés (page 1076).

Voir également l'aperçu général et la bibliographie à la page 824.

Microscopie :
spores et cystides
b. = boucles.
cyst. = cystides.

Le nombre approximatif d'espèces s'applique à l'Europe tempérée.

