

第三次作业 5.1, 5.3, 5.14 (2), 5.22

5.1 设 (x_1, x_2, \dots, x_n) 及 (u_1, u_2, \dots, u_n) 为两组子样观测值, 它们有如下关系

$$u_i = \frac{x_i - a}{b} \quad (b \neq 0, a \text{ 都为常数})$$

求子样平均值 \bar{u} 与 \bar{x} , 子样方差 S_u^2 与 S_x^2 之间的关系.

解:

$$\begin{aligned}\bar{u} &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n u_i = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{x_i - a}{b} = \frac{1}{b} \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i - a \right) = \frac{1}{b} (\bar{x} - a) \\ S_u^2 &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (u_i - \bar{u})^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\frac{x_i - a}{b} - \frac{\bar{x} - a}{b} \right)^2 = \frac{1}{b^2} \left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \right] = \frac{1}{b^2} S_x^2.\end{aligned}$$

5.3 利用切比雪夫不等式求钱币需要抛多少次才能使子样均值 $\bar{\xi}$ 落在0.4到0.6之间的概率至少为0.9? 如何才能更精确地计算使概率接近0.9所抛的次数是多少?

解. 设需抛钱币为 n 次. 又设第 i 次抛钱币时,

$$\xi_i = \begin{cases} 1 & \text{第 } i \text{ 次抛出正面,} \\ 0 & \text{第 } i \text{ 次抛出反面,} \end{cases} \quad i = 1, 2, \dots, n$$

则 ξ_i 独立同分布, 且有分布 $P(\xi_1 = 1) = P\{\xi_1 = 0\} = \frac{1}{2}$. 计算得

$$E\xi_i = \frac{1}{2}, \quad D\xi_i = \frac{1}{4}, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

由于 $\bar{\xi} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \xi_i$, 易知 $E\bar{\xi} = \frac{1}{2}$, $D\bar{\xi} = \frac{1}{4n}$. 那么依据题意, 我们有

$$\begin{aligned}P(0.4 \leq \bar{\xi} \leq 0.6) &= P(|\bar{\xi} - E\bar{\xi}| \leq 0.1) \\ &\geq 1 - \frac{E|\bar{\xi} - E\bar{\xi}|^2}{0.01} \geq 0.9\end{aligned}$$

解得 $n \geq 250$, 所以至少需要抛250 次.

另一方面, 利用中心极限定理, 我们有

$$\begin{aligned}P(0.4 \leq \bar{\xi} \leq 0.6) &= P\left(-0.2 \sqrt{n} \leq \frac{\bar{\xi} - E\bar{\xi}}{\sqrt{\frac{1}{4n}}} \leq 0.2 \sqrt{n}\right) \\ &\approx 2\Phi(0.2 \sqrt{n}) - 1 \geq 0.9\end{aligned}$$

解得 $n \geq 68.0625$, 所以至少需要抛69次.(68问题也不大)

□

5.14 设母体 ξ 服从参数为 λ 的泊松分布, $(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)$ 是取自此母体的一个子样. 求

(1) 子样的联合概率分布列;

(2) 子样均值 $\bar{\xi}$ 的分布列、 $E\bar{\xi}$, $D\bar{\xi}$ 和 ES_n^2 .

解: (1) 子样的联合分布列:

$$P(\xi_1 = x_1, \xi_2 = x_2, \dots, \xi_n = x_n) = \prod_{i=1}^n P(\xi_i = x_i) = \prod_{i=1}^n \frac{\lambda^{x_i}}{x_i!} e^{-\lambda} = \lambda^{\sum_{i=1}^n x_i} e^{-n\lambda} (\prod_{i=1}^n x_i!)^{-1},$$

$$x_i = 0, 1, 2, \dots, i = 1, 2, \dots, n.$$

(2) 设母体 ξ 服从参数为 λ 的泊松分布, $(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)$ 是取自此母体的一个子样. 求子样均值 $\bar{\xi}$ 的分布列, $E\bar{\xi}$, $D\bar{\xi}$ 和 ES_n^2 .

解. 由题意, $n\bar{\xi} \sim P(n\lambda)$, 所以

$$P\left(\bar{\xi} = \frac{k}{n}\right) = e^{-n\lambda} \frac{(n\lambda)^k}{k!} \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

$$E\bar{\xi} = \frac{1}{n} E[n\bar{\xi}] \lambda,$$

$$D\bar{\xi} = \frac{D[n\bar{\xi}]}{n^2} = \frac{\lambda}{n},$$

$$ES_n^2 = \frac{n-1}{n} D\bar{\xi} = \frac{n-1}{n} \lambda$$

□

5.22 设母体 ξ 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, $\bar{\xi}$ 和 S_n^2 分别为容量为 n 的子样均值和子样方差, 又设 $\xi_{n+1} \sim N(\mu, \sigma^2)$ 且与 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ 独立. 试求统计量

$$\frac{\xi_{n+1} - \bar{\xi}}{S_n} \sqrt{\frac{n-1}{n+1}}$$

的抽样分布.

解. 由题可得

$$\frac{\xi_{n+1} - \bar{\xi}}{S_n} \sqrt{\frac{n-1}{n+1}} = \frac{\frac{1}{\sigma} \sqrt{\frac{n}{n+1}} (\xi_{n+1} - \bar{\xi})}{\sqrt{\frac{nS_n^2}{\sigma^2(n-1)}}}$$

而

$$\frac{1}{\sigma} \sqrt{\frac{n}{n+1}} (\xi_{n+1} - \bar{\xi}) \sim N(0, 1),$$

$$\sqrt{\frac{nS_n^2}{\sigma^2(n-1)}} \sim \chi_{(n-1)}^2.$$

$$\text{所以 } \frac{\xi_{n+1} - \bar{\xi}}{S_n} \sqrt{\frac{n-1}{n+1}} \sim t(n-1).$$

□