

MINISTERIO DA SAUDE E SBIm - GUIA OFICIAL DE IMUNIZACAO

1. Calendario Nacional de Vacinacao da Gestante

O Programa Nacional de Imunizacoes (PNI/MS) e a Sociedade Brasileira de Imunizacoes (SBIm) estabelecem as seguintes recomendacoes fundamentais para a saude da gestante e do concepto:

1. Vacina dTpa (Triplice Bacteriana Acelular do tipo adulto - Difteria, Tetano e Coqueluche):

- Indicacao: Uma dose a cada gestacao, a partir da 20a semana de gestacao.
- Objetivo: Transmissao de anticorpos maternos contra a coqueluche ao feto via placenta, garantindo protecao passiva nos primeiros meses de vida do recém-nascido.
- Se a gestante nao recebeu durante o pre-natal, aplicar uma dose no puerperio imediato.

2. Vacina contra Hepatite B:

- Indicacao: 3 doses (esquema 0, 1 e 6 meses), indicada para gestantes nao vacinadas previamente.
- Previne a transmissao vertical do virus da Hepatite B.

3. Vacina Influenza (Gripe):

- Indicacao: Dose unica anual, aplicavel em qualquer trimestre da gestacao.
- Indicada prioritariamente a todas as gestantes e puerperas (ate 45 dias pos-parto).

4. Vacinas Contraindicadas durante a Gestacao:

- Vacinas com virus vivos atenuados sao estritamente contraindicadas:
Triplice Viral (Sarampo, Caxumba, Rubéola), Febre Amarela, Varicela e Dengue.

MINISTERIO DA SAUDE E SBIm - GUIA OFICIAL DE IMUNIZACAO

2. Calendario de Vacinacao do Adulto e do Idoso (60 anos ou mais)

Diretrizes oficiais para atualizacao vacinal na fase adulta e terceira idade:

1. Vacina Dupla Adulto (dT - Difteria e Tetano):

- Reforco a cada 10 anos apos o esquema basico completo.
- Em caso de ferimentos graves ou contaminados, antecipar o reforco para intervalo de 5 anos.

2. Vacina Pneumococica (VPC13 e VPP23):

- Indicada para todos os idosos a partir de 60 anos e adultos com doencas cronicas (diabetes, cardiopatias).
- Esquema sequencial: Dose inicial de VPC13 seguida por VPP23 apos 6 a 12 meses.
- Reduz o risco de pneumonias graves, meningite e bacteremia pneumococica.

3. Vacina contra Herpes Zoster:

- Recomendada pela SBIm para adultos com 50 anos ou mais (esquema de 2 doses com intervalo de 2 meses).
- Previne a neuralgia pos-herpetica e reativacao do virus da varicela-zoster.

4. Vacina contra Febre Amarela:

- Dose unica para pessoas de 9 meses a 59 anos residentes ou viajantes em areas recomendadas.
- Para idosos com mais de 60 anos, a vacina requer avaliacao medica de risco-beneficio antes da aplicacao.