

Eficácia, Efetividade e Proteção das Vacinas (OMS)

Eficácia, Efetividade e Proteção das Vacinas - Organização Mundial da Saúde (OMS)

10 de março de 2025 | Tempo de leitura: 2 min

Este artigo faz parte de uma série de explicações sobre desenvolvimento e distribuição de vacinas, produzida pela OMS.

As vacinas são seguras, eficazes e salvam vidas. Antes de serem aprovadas pelas agências reguladoras competentes, as vacinas passam por rigorosos ensaios clínicos para testar sua qualidade, segurança e eficácia. Depois da aprovação, elas continuam sendo monitoradas de perto quanto à segurança e efetividade contínuas.

Eficácia e Efetividade da Vacina

Para entender o quão bem as vacinas funcionam, é importante distinguir eficácia e efetividade.

A eficácia da vacina é medida em ensaios clínicos controlados. Baseia-se em quantas pessoas vacinadas desenvolveram o "desfecho de interesse" (geralmente a doença), comparado com quantas pessoas que receberam o placebo (vacina fictícia) desenvolveram o mesmo desfecho.

A eficácia da vacina nos diz o quanto a vacina reduz o risco do desfecho (por exemplo, ficar doente) em um cenário de ensaio clínico. Por exemplo, se uma vacina tem uma taxa de eficácia de 80%, isso significa que o grupo vacinado teve um risco 80% menor de desenvolver a doença do que o grupo não vacinado (que recebeu o placebo).

Importante: se uma vacina tem eficácia de 80%, isso NÃO significa que ela só funciona 80% das vezes. Significa que, em uma população vacinada, 80% menos pessoas vão contrair a doença quando entrarem em contato com o vírus.

A efetividade da vacina se refere ao quão bem as vacinas funcionam no mundo real. Os ensaios clínicos incluem uma ampla gama de pessoas — faixa etária variada, ambos os sexos, diferentes etnias e pessoas com condições médicas conhecidas — mas eles não podem ser uma representação perfeita de toda a população.

A eficácia observada em ensaios clínicos se aplica a desfechos específicos em um estudo, enquanto a efetividade mede o quão bem as vacinas funcionam no mundo real. A efetividade pode diferir da eficácia porque não é possível prever exatamente quão efetiva será a vacinação para uma população muito maior e mais variada, sendo vacinada em condições reais.

Proteção e Momento da Vacina

As vacinas funcionam construindo uma proteção forte contra a doença. Algumas vacinas exigem apenas uma dose para construir proteção, enquanto outras precisam de múltiplas doses espaçadas — chamada de série primária — para desenvolver proteção completa.

Por exemplo, em uma série primária de três doses, a primeira dose inicia alguma proteção, e a segunda e terceira doses ajudam a alcançar imunidade máxima e manter a proteção ao longo do tempo.

O número ideal de doses e o esquema foram determinados em ensaios clínicos e posteriormente avaliados em estudos de efetividade. Seguir o esquema de vacinação recomendado é essencial para uma proteção efetiva e sustentada.

Doses de Reforço

A proteção da dose inicial ou série primária pode enfraquecer com o tempo. As doses de reforço ajudam a fortalecer e estender a proteção, mantendo o sistema imunológico pronto para combater infecções.

As autoridades de saúde recomendam doses de reforço com base em evidências científicas que mostram que doses adicionais podem ajudar a aumentar e estender a proteção. É necessária proteção sustentada, particularmente para doenças com maior risco de surtos.

Proteção da Vacina e Infecção

As vacinas podem impedir que a maioria das pessoas fique doente, mas não todas. Mesmo depois de alguém receber todas as doses recomendadas e esperar algumas semanas para a imunidade se desenvolver, ainda existe uma chance de infecção. As vacinas não oferecem proteção total (100%) devido a muitos fatores, incluindo nossas diferenças individuais de imunidade e resposta à infecção.

Podem ocorrer "infecções de escape" (breakthrough infections) — quando pessoas são infectadas mesmo tendo sido totalmente vacinadas.

As vacinas não oferecem proteção total (100%), então infecções de escape podem acontecer. Mas conforme mais pessoas se vacinam, espera-se que menos pessoas entrem em contato com o germe.

Se pessoas vacinadas ficarem doentes, é provável que tenham sintomas mais leves, em geral. É muito raro que uma pessoa vacinada tenha uma doença grave ou morra.

Proteção da Vacina e Variantes

Vírus e bactérias podem mudar ao longo do tempo, às vezes levando a novas variantes que se espalham mais facilmente ou causam doença mais grave. A OMS monitora continuamente essas mudanças e atualiza as orientações para garantir que as vacinas ofereçam a melhor proteção possível.

Fonte: World Health Organization

([who.int/news-room/feature-stories/detail/vaccine-efficacy-effectiveness-and-protection](https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/vaccine-efficacy-effectiveness-and-protection))