

Mi plan para reducir riesgos

Elija las partes que encajen con su patrón real. Esto no es una promesa de ser perfecto/a.

La sustancia o situación que más quiero hacer más segura:

¿Qué aumenta mi riesgo?

Consumir a solas	Suministro desconocido o cambiante
Pueden estar involucrados opioides	Mezclar sustancias
Alcohol con otras drogas	Medicamentos sedantes
Periodo reciente sin consumir	Consumir más de lo que pensaba
Deseos intensos o abstinencia	Problemas de vivienda o privacidad
Consumir cuando estoy muy alterado/a	Dolor o problemas médicos
No estoy seguro/a de qué contiene la sustancia	Otro

El riesgo que más quiero reducir:

Medidas de seguridad que estoy dispuesto/a a usar

Llevar naloxona	Decirle a alguien dónde está la naloxona
Evitar consumir a solas	Pedir que alguien me revise
Usar análisis de sustancias / tiras de fentanilo	Evitar mezclar sustancias sedantes
Usar menos si el suministro o la tolerancia son inciertos	Mantener visible la información de emergencia
Usar equipo estéril / suministros más seguros	Buscar antes atención de heridas o atención médica
Hablar con un prescriptor o farmacéutico	Preguntar por tratamiento con medicamentos

Plan para momentos de mayor riesgo

Una situación en que mi riesgo suele aumentar:

Una persona o servicio con quien puedo comunicarme antes o durante esa situación:

Si he estado sin consumir o consumiendo menos por un tiempo, ¿cómo tendré en cuenta la menor tolerancia?

Dónde guardaré la naloxona u otros suministros de emergencia:

Qué quiero que hagan las personas a mi alrededor si no respondo o dejo de respirar normalmente:

Meta de cambio, si quiero elegir una

- Hacer una parte más segura
- Consumir con menos frecuencia
- Usar una cantidad menor
- Evitar una combinación de alto riesgo
- Probar tratamiento con medicamentos
- Probar consejería o apoyo de pares
- Hacer una pausa en el consumo
- Trabajar hacia la abstinencia
- Todavía no elijo una meta de cambio

Mi siguiente paso:

Precaución médica. Si puede existir dependencia física del alcohol o las benzodiazepinas, no asuma que dejar de consumir abruptamente en casa es seguro. Busque orientación médica sobre el riesgo de abstinencia.