

ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាធុនតូច
 សម័យប្រឡង ០៥ វិច្ឆិកា ២០២៣
 វិញ្ញាសា គណិតវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)
 រយៈពេល ១៥០ នាទី
 ពិន្ទុ ១២៥

មណ្ឌលប្រឡង.....
 លេខបន្ទប់..... លេខគុ.....
 ឈ្មោះបេក្ខជន.....
 ហត្ថលេខាបេក្ខជន.....

ប្រធាន

- I. (១០ពិន្ទុ) គណនាលីមីត $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[x \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) \right]$ បើគេដឹងថា $\lim_{X \rightarrow 0} \frac{\ln(1+X)}{X} = 1$
- ខ $\lim_{x \rightarrow -\frac{\pi}{2}} \frac{1 - \sin^2 x}{2 + 2 \sin x}$ គ $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^3 - 27}{27(\sqrt{x+6} - 3)}$
- II. (១៥ពិន្ទុ) គណនាអាំងតេក្រាល ៖ ក $I = \int_0^3 (x-1)(x+3)dx$ ខ $J = \int_0^{\frac{\pi}{2}} 5 \sin^4 x \cos x dx$ គ $K = \int_{\frac{1}{2}}^1 \left(\frac{3}{2x+1} \right) dx$
- III. (១៥ពិន្ទុ) ដោះស្រាយក្នុងសំណុំចំនួនកុំផ្លិចនូវសមីការ $z^2 + 4z + 16 = 0$ ។
 សរសេរចម្លើយទាំងពីរតាងដោយ z_1 និង z_2 ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ។
- IV. (១៥ពិន្ទុ) អ្នកលក់បន្លាត់ម្នាក់ គាត់មានបន្លាត់ជ័រសំប៉ែតចំនួន 25 ដែលក្នុងនោះមានបន្លាត់ 3 ដែលនែបចុង។
 គេចាប់យកបន្លាត់មួយក្នុងចំណោម 25 ដោយចៃដន្យ។
- ១ រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ A : " បន្លាត់ដែលចាប់បានមិននែបចុង " ។
- ២ អ្នកទិញគាត់ចាប់យកដោយមិនជ្រៀងផ្ទាត់ ហើយគាត់ចង់បានដាច់ខាតបន្លាត់ល្អចំនួន 7 តើគាត់ត្រូវទិញបន្លាត់យ៉ាងតិចប៉ុន្មាន?
- ៣ គេចាប់យកបន្លាត់ 2 ម្តងដោយចៃដន្យក្នុងចំណោមបន្លាត់ទាំង 25 ។ រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ B : " បន្លាត់ទាំងពីរចាប់បានមិននែបចុង " ។
- V. (២៥ពិន្ទុ)
- ១ ក្នុងលំហប្រដាប់ដោយតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ គេមានចំណុច $A(5, -5, 2), B(-1, 1, 0), C(0, 1, 2)$ និង $D(6, 6, -1)$ ។
- ក បង្ហាញចំណុច A, B, C មិននៅលើបន្ទាត់តែមួយ។
- ខ បង្ហាញថាត្រីកោណ BCD ជាត្រីកោណកែង និងរកផ្ទៃក្រឡារបស់ត្រីកោណនេះ។
- ២ គេមានសមីការ $12(xy+3) - (3x+2y)^2 = 0$ ។
- ក បង្ហាញសមីការនេះជាសមីការអេលីប
- ខ ចូររកប្រវែងអ័ក្សតូច អ័ក្សធំ និងកូអរដោនេនៃកំពូលទាំងពីរ។ រួចសង់អេលីបនេះ។
- VI. (១០ពិន្ទុ)
- ក ដោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $(E) : 3y'' = 9y - 6y'$ ។
- ខ រកចម្លើយពិសេសមួយរបស់សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល (E) ដែល $y(0) = 1$ និង $y'(1) = e$ ។ ($\ln e = 1$)
- VII. (៤០ពិន្ទុ) គេមានអនុគមន៍ f កំណត់លើ $\mathbb{R}$ ដោយ $f(x) = 4 - x - 2e^{-x}$ ។ គេតាង (C) ជាក្រាបរបស់ f ។
- ១ ក ជ្រៀងផ្ទាត់ថាគ្រប់ចំនួនពិត $x; f(x) = \frac{4e^x - xe^x - 2}{e^x}$ ។ គណនា $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ និង $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ ($\lim_{x \rightarrow -\infty} xe^x = 0$)
- ខ បង្ហាញថាបន្ទាត់ (D) ដែលមានសមីការ $y = -x + 4$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប (C) ។
- គ សិក្សាទីតាំងនៃ (C) ធៀបនឹង (D) ។
- ២ ក គណនា $f'(x)$ ដែល $f'(x)$ ជាដេរីវេនៃ $f(x)$ ។ សិក្សាអថេរភាពនៃ f និងគណនាតម្លៃអតិបរមារបស់ f ។
- ខ A ជាចំណុចនៃ (C) ដែលមានអាប់ស៊ីស 0 ។ រកសមីការបន្ទាត់ប៉ះ (T) ទៅនឹងក្រាប (C) ត្រង់ចំណុច A ។
- គ បង្ហាញថាសមីការ $f(x) = 0$ មានចម្លើយតែមួយគត់ β នៅក្នុងចន្លោះ $[-1, 0]$
- ឃ សង់បន្ទាត់ប៉ះ (T) អាស៊ីមតូត (D) និងក្រាប (C) ។

I. (១០ពិន្ទុ) គណនាលីមីត

$$\begin{aligned} & \text{ក } \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[x \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) \right] \\ & \text{តាង } X = \frac{1}{x} \text{ ៖ កាលណា } x \rightarrow +\infty \implies X \rightarrow 0 \\ & \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[x \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) \right] = \lim_{X \rightarrow 0} \left[\frac{1}{X} \ln(1 + X) \right] \\ & = \lim_{X \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + X)}{X} \\ & = 1 \quad (\text{តាមសម្មតិកម្ម}) \end{aligned}$$

$$\text{ដូចនេះ } \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[x \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) \right] = 1 \text{ ។}$$

$$\begin{aligned} & \text{ខ } \lim_{x \rightarrow -\frac{\pi}{2}} \frac{1 - \sin^2 x}{2 + 2 \sin x} \\ & \lim_{x \rightarrow -\frac{\pi}{2}} \frac{1 - \sin^2 x}{2 + 2 \sin x} = \lim_{x \rightarrow -\frac{\pi}{2}} \frac{(1 - \sin x)(1 + \sin x)}{2(1 + \sin x)} \\ & = \lim_{x \rightarrow -\frac{\pi}{2}} \frac{1 - \sin x}{2} \\ & = \frac{1 - \sin(-\frac{\pi}{2})}{2} \\ & = \frac{1 - (-1)}{2} = \frac{2}{2} = 1 \end{aligned}$$

$$\text{ដូចនេះ } \lim_{x \rightarrow -\frac{\pi}{2}} \frac{1 - \sin^2 x}{2 + 2 \sin x} = 1 \text{ ។}$$

$$\begin{aligned} & \text{គ } \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^3 - 27}{27(\sqrt{x+6} - 3)} \text{ រាងមិនកំណត់ } \frac{0}{0} \\ & \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^3 - 27}{27(\sqrt{x+6} - 3)} \\ & = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x-3)(x^2+3x+9)(\sqrt{x+6}+3)}{27[(\sqrt{x+6})^2 - 3^2]} \\ & = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x-3)(x^2+3x+9)(\sqrt{x+6}+3)}{27(x+6-9)} \\ & = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x-3)(x^2+3x+9)(\sqrt{x+6}+3)}{27(x-3)} \\ & = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x^2+3x+9)(\sqrt{x+6}+3)}{27} \\ & = \frac{(3^2+3(3)+9)(\sqrt{3+6}+3)}{27} \\ & = \frac{27(3+3)}{27} = 6 \end{aligned}$$

$$\text{ដូចនេះ } \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^3 - 27}{27(\sqrt{x+6} - 3)} = 6 \text{ ។}$$

II. (១៥ពិន្ទុ) គណនាអាំងតេក្រាល ៖

$$\begin{aligned} & \text{ក } I = \int_0^3 (x-1)(x+3) dx \\ & I = \int_0^3 (x^2 + 3x - x - 3) dx \\ & = \int_0^3 (x^2 + 2x - 3) dx \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & = \left[\frac{x^3}{3} + x^2 - 3x \right]_0^3 \\ & = \left(\frac{3^3}{3} + 3^2 - 3(3) \right) - (0) \end{aligned}$$

$$= (9 + 9 - 9) = 9$$

$$\text{ដូចនេះ } I = 9 \text{ ។}$$

$$\text{ខ } J = \int_0^{\frac{\pi}{2}} 5 \sin^4 x \cos x dx$$

$$\text{តាង } u = \sin x \implies du = \cos x dx$$

$$\bullet \text{ បើ } x = 0 \implies u = \sin 0 = 0$$

$$\bullet \text{ បើ } x = \frac{\pi}{2} \implies u = \sin \frac{\pi}{2} = 1$$

$$\text{យើងបាន } J = \int_0^1 5u^4 du = [u^5]_0^1 = 1^5 - 0^5 = 1$$

$$\text{ដូចនេះ } J = 1 \text{ ។}$$

$$\text{គ } K = \int_{\frac{1}{2}}^1 \left(\frac{3}{2x+1} \right) dx$$

$$K = 3 \cdot \frac{1}{2} \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{2}{2x+1} dx$$

$$= \frac{3}{2} [\ln |2x+1|]_{\frac{1}{2}}^1$$

$$= \frac{3}{2} \left(\ln |2(1)+1| - \ln \left| 2 \left(\frac{1}{2} \right) + 1 \right| \right)$$

$$= \frac{3}{2} (\ln 3 - \ln 2)$$

$$= \frac{3}{2} \ln \left(\frac{3}{2} \right)$$

$$\text{ដូចនេះ } K = \frac{3}{2} \ln \left(\frac{3}{2} \right) \text{ ។}$$

III. (១៥ពិន្ទុ) ដោះស្រាយសមីការ $z^2 + 4z + 16 = 0$

$$\bullet \text{ ដោះស្រាយសមីការ } z^2 + 4z + 16 = 0 \text{ ៖}$$

$$\text{យើងមាន } a = 1, b' = 2, c = 16$$

$$\text{តាមរូបមន្ត } \Delta' = b'^2 - ac$$

$$\Delta' = 2^2 - 1(16)$$

$$= 4 - 16 = -12 = 12i^2 = (2\sqrt{3}i)^2$$

$$\text{នាំឱ្យសមីការមានឫសកុំផ្លិចពីរឆ្លាស់គ្នា}$$

$$z_1 = \frac{-b' + \sqrt{\Delta'}}{a} = \frac{-2 + 2\sqrt{3}i}{1} = -2 + 2\sqrt{3}i$$

$$z_2 = \frac{-b' - \sqrt{\Delta'}}{a} = \frac{-2 - 2\sqrt{3}i}{1} = -2 - 2\sqrt{3}i$$

$$\bullet \text{ សរសេរចម្លើយទាំងពីរជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ៖}$$

$$\text{ចំពោះ } z_1 = -2 + 2\sqrt{3}i$$

$$- \text{ រកម៉ូឌុល } r_1 \text{ ៖}$$

$$r_1 = \sqrt{(-2)^2 + (2\sqrt{3})^2} = \sqrt{4 + 12} = \sqrt{16} = 4$$

- រកអកុយម៉ង់ θ_1 ៖

$$\cos \theta_1 = \frac{x_1}{r_1} = \frac{-2}{4} = -\frac{1}{2}$$

$$\sin \theta_1 = \frac{y_1}{r_1} = \frac{2\sqrt{3}}{4} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

ដោយ $\cos \theta_1 < 0$ និង $\sin \theta_1 > 0$ នោះ θ_1

$$\text{ស្ថិតក្នុងការជ្រុងទី២៖ } \theta_1 = \pi - \frac{\pi}{3} = \frac{2\pi}{3}$$

$$\text{យើងបាន } z_1 = 4 \left(\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3} \right) \text{ ។}$$

$$\text{ចំពោះ } z_2 = -2 - 2\sqrt{3}i$$

ដោយសារ $z_2 = \overline{z_1}$ (ជាចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់នៃ z_1) នាំឱ្យ៖

$$\text{- ម៉ូឌុល } r_2 = r_1 = 4$$

$$\text{- អកុយម៉ង់ } \theta_2 = -\theta_1 = -\frac{2\pi}{3}$$

$$\text{យើងបាន } z_2 = 4 \left[\cos \left(-\frac{2\pi}{3} \right) + i \sin \left(-\frac{2\pi}{3} \right) \right] \text{ ។}$$

IV. (១៥ពិន្ទុ)

១ រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ A ៖ "បន្ទាត់ដែលចាប់បានមិនស្របចុង"

- ចំនួនបន្ទាត់សរុប $n(S) = 25$
- ចំនួនបន្ទាត់ស្របចុង មាន 3 នាំឱ្យចំនួនបន្ទាត់ល្អ (មិនស្រប)

$$\text{មាន } 25 - 3 = 22$$

$$\text{ចំនួនករណីស្រប } n(A) = C(22, 1) = 22$$

$$\text{គេបាន } P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{22}{25} = 0.88 \text{ ។}$$

២ រកចំនួនបន្ទាត់យ៉ាងតិចបំផុតដែលគាត់ត្រូវទិញ

ដើម្បីធានាថាបានបន្ទាត់ល្អ 7 គ្រឿងដាច់ខាត (ទោះជាក្នុងករណីដែលគាត់សឹមបំផុតក៏ដោយ) គឺគាត់ត្រូវគិតក្នុងករណីដែលគាត់ចាប់ចំប៉ះតែបន្ទាត់ស្របចុងទាំងអស់មុនគេ ។

- ចំនួនបន្ទាត់ស្របចុងទាំងអស់មាន៖ 3 បន្ទាត់
- ចំនួនបន្ទាត់ល្អដែលគាត់ចង់បានដាច់ខាត៖ 7 បន្ទាត់

នាំឱ្យចំនួនបន្ទាត់យ៉ាងតិចបំផុតដែលគាត់ត្រូវទិញគឺ

$$N = 3 + 7 = 10 \text{ បន្ទាត់ ។}$$

៣ រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ B ៖ "បន្ទាត់ទាំងពីរចាប់បានមិនស្របចុង"

- ចំនួនករណីអាច $n(S) = C(25, 2) = \frac{25 \times 24}{2 \times 1} = 300$
- ចំនួនករណីស្រប $n(B) = C(22, 2) = \frac{22 \times 21}{2 \times 1} = 231$

$$\text{គេបាន } P(B) = \frac{n(B)}{n(S)} = \frac{231}{300} = \frac{77}{100} \text{ ។}$$

V. (២៥ពិន្ទុ)

១ ក បង្ហាញថាចំណុច A, B, C មិននៅលើបន្ទាត់តែមួយ៖

$$\overrightarrow{AB} = (-1 - 5, 1 - (-5), 0 - 2) = (-6, 6, -2)$$

$$\overrightarrow{AC} = (0 - 5, 1 - (-5), 2 - 2) = (-5, 6, 0)$$

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -6 & 6 & -2 \\ -5 & 6 & 0 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} 6 & -2 \\ 6 & 0 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} -6 & -2 \\ -5 & 0 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} -6 & 6 \\ -5 & 6 \end{vmatrix} \vec{k} \\ &= 12\vec{i} - (0 - 10)\vec{j} + (-36 + 30)\vec{k} \\ &= 12\vec{i} + 10\vec{j} - 6\vec{k} = (12, 10, -6) \end{aligned}$$

$$\text{ដោយ } \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = (12, 10, -6) \neq (0, 0, 0)$$

ដូចនេះ ចំណុច A, B, C មិននៅលើបន្ទាត់តែមួយឡើយ ។

២ បង្ហាញថាត្រីកោណ BCD ជាត្រីកោណកែង

$$\overrightarrow{BC} = (0 - (-1), 1 - 1, 2 - 0) = (1, 0, 2)$$

$$\overrightarrow{CD} = (6 - 0, 6 - 1, -1 - 2) = (6, 5, -3)$$

$$\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{CD} = (1)(6) + (0)(5) + (2)(-3)$$

$$= 6 + 0 - 6 = 0$$

$$\text{ដោយ } \overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{CD} = 0 \implies \overrightarrow{BC} \perp \overrightarrow{CD} \text{ ។}$$

ដូចនេះ ត្រីកោណ BCD ជាត្រីកោណកែងត្រង់កំពូល C ។

រកផ្ទៃក្រឡានៃត្រីកោណ BCD ៖

$$BC = \sqrt{1^2 + 0^2 + 2^2} = \sqrt{5}$$

$$CD = \sqrt{6^2 + 5^2 + (-3)^2} = \sqrt{36 + 25 + 9} = \sqrt{70}$$

ផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណកែង

$$S = \frac{1}{2} \times BC \times CD$$

$$= \frac{1}{2} \times \sqrt{5} \times \sqrt{70}$$

$$= \frac{1}{2} \times \sqrt{350} = \frac{5\sqrt{14}}{2} \text{ (ឯកតាផ្ទៃ ។)}$$

២ ក បង្ហាញសមីការនេះជាសមីការអេលីប

$$\text{យើង មាន } 12(xy + 3) - (3x + 2y)^2 = 0$$

$$12xy + 36 - (9x^2 + 12xy + 4y^2) = 0$$

$$12xy + 36 - 9x^2 - 12xy - 4y^2 = 0$$

$$-9x^2 - 4y^2 = -36$$

$$9x^2 + 4y^2 = 36$$

$$\frac{9x^2}{36} + \frac{4y^2}{36} = 1$$

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$$

$$\frac{x^2}{2^2} + \frac{y^2}{3^2} = 1$$


មានទម្រង់ $\frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1$ ជាសមីការស្តង់ដារនៃអេលីប្រាស្តិកក្នុងប្លង់ និងមានផ្ចិតនៅគល់តម្រុយ $O(0,0)$ ។

២ រកប្រវែងអ័ក្សតូច អ័ក្សធំ កូអរដោនេកំពូល សង់អេលីប្រាស្តិក

តាមសមីការខាងលើ យើងទាញបាន $a = 3$ និង $b = 2$ ៖

- ប្រវែងអ័ក្សធំ៖ $2a = 2(3) = 6$ ឯកតា
- ប្រវែងអ័ក្សតូច៖ $2b = 2(2) = 4$ ឯកតា
- កូអរដោនេនៃកំពូលទាំងពីរ៖ ព្រោះជាអេលីប្រាស្តិក ឱ្យកំពូលស្ថិតនៅលើអ័ក្ស y គឺ $V_1(0, a) = V_1(0, 3)$ និង $V_2(0, -a) = V_2(0, -3)$ ។

គ សង់អេលីប្រាស្តិក៖



VI. (១០ពិន្ទុ) ដំណោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល

ក ដោះស្រាយសមីការ $(E) : 3y'' = 9y - 6y'$

$$\text{យើងសរសេរ } 3y'' + 6y' - 9y = 0$$

$$y'' + 2y' - 3y = 0$$

$$\text{សមីការសម្គាល់ } r^2 + 2r - 3 = 0$$

$$\text{មេគុណ } a + b + c = 1 + 2 + (-3) = 0$$

$$\text{នាំឱ្យសមីការមានឫសពីរផ្សេងគ្នា } r_1 = 1 \text{ ឬ } r_2 = \frac{c}{a} = -3$$

ចម្លើយទូទៅនៃសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលគឺស្ថិតក្នុងទម្រង់ $y =$

$$c_1 e^{r_1 x} + c_2 e^{r_2 x} \text{ ៖ } y = c_1 e^x + c_2 e^{-3x} \quad (c_1, c_2 \in \mathbb{R})$$

ដូចនេះ ចម្លើយទូទៅនៃសមីការ (E) គឺ

$$y = c_1 e^x + c_2 e^{-3x} \text{ ដែល } c_1, c_2 \text{ ជាចំនួនពិតថេរ ។}$$

២ រកចម្លើយពិសេសមួយរបស់សមីការ (E)

$$\text{យើងមាន } y = c_1 e^x + c_2 e^{-3x}$$

$$y' = (c_1 e^x + c_2 e^{-3x})'$$

$$= c_1 e^x - 3c_2 e^{-3x}$$

$$\bullet \text{ ចំពោះ } y(0) = 1$$

$$\implies c_1 e^0 + c_2 e^0 = 1 \implies c_1 + c_2 = 1 \quad (1)$$

$$\bullet \text{ ចំពោះ } y'(1) = e$$

$$\implies c_1 e^1 - 3c_2 e^{-3(1)} = e$$

$$\implies c_1 e - \frac{3c_2}{e^3} = e \quad (2)$$

តាមសមីការ (1) យើងទាញបាន $c_1 = 1 - c_2$ យកទៅជួសក្នុង

$$(1 - c_2)e - \frac{3c_2}{e^3} = e$$

$$\text{សមីការ (2)៖ } e - c_2 e - \frac{3c_2}{e^3} = e$$

$$-c_2 \left(e + \frac{3}{e^3} \right) = 0$$

$$\text{ដោយ } e + \frac{3}{e^3} \neq 0 \text{ នាំឱ្យយើងទាញបាន } c_2 = 0$$

យក $c_2 = 0$ ទៅជួសក្នុង (1) វិញ យើងបាន

$$c_1 + 0 = 1 \implies c_1 = 1$$

$$\text{គេបាន } y = 1 \cdot e^x + 0 \cdot e^{-3x} = e^x$$

ដូចនេះ ចម្លើយពិសេសដែលត្រូវរកគឺ $y = e^x$ ។

VII. (៤០ពិន្ទុ)

១ ក ផ្ទៀងផ្ទាត់ថា $f(x) = \frac{4e^x - xe^x - 2}{e^x}$

$$\text{យើងមាន } f(x) = 4 - x - 2e^{-x}$$

$$f(x) = 4 - x - \frac{2}{e^x}$$

$$= \frac{4(e^x) - x(e^x) - 2}{e^x}$$

$$= \frac{4e^x - xe^x - 2}{e^x} \quad (\text{ពិត})$$

គណនាលីមីតត្រង់ចុងដែនកំណត់៖

$$\bullet \text{ គណនា } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \text{ ៖}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (4 - x - 2e^{-x})$$

$$\text{ដោយ } \lim_{x \rightarrow +\infty} (-x) = -\infty \text{ និង } \lim_{x \rightarrow +\infty} 2e^{-x} = 0$$

$$\text{នាំឱ្យ } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$$

$$\bullet \text{ គណនា } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) \text{ ៖}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{4e^x - xe^x - 2}{e^x}$$

$$\text{ដោយ } \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0 \text{ និង } \lim_{x \rightarrow -\infty} xe^x = 0$$

$$\text{នាំឱ្យ } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \frac{-2}{0^+} = -\infty$$

២ បង្ហាញថា $(D) : y = -x + 4$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃ (C)

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - y_D]$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} [(4 - x - 2e^{-x}) - (-x + 4)]$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} (-2e^{-x}) = 0$$

$$\text{ដោយ } \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - y_D] = 0$$

នាំឱ្យបន្ទាត់ $(D) : y = -x + 4$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃ

ក្រាប (C) ខាង $+\infty$ ។

ក សិក្សាទីតាំងនៃ (C) ធៀបនឹង (D) ៖

យើងពិនិត្យសញ្ញានៃ $f(x) - y_D = -2e^{-x}$

គ្រប់ $x \in \mathbb{R}$; $e^{-x} > 0 \implies -2e^{-x} < 0$ ជានិច្ច។

ដូចនេះ ក្រាប (C) ស្ថិតនៅខាងក្រោមបន្ទាត់អាស៊ីមតូតទ្រេត (D) ជានិច្ចលើ $\mathbb{R}$ ។

២ ក គណនាដេរីវេ $f'(x)$ ៖

$$\begin{aligned} f'(x) &= (4 - x - 2e^{-x})' \\ &= 0 - 1 - 2(-e^{-x}) \\ &= -1 + 2e^{-x} \end{aligned}$$

សិក្សាអថេរភាពនៃ f ៖

$$\begin{aligned} \text{ឱ្យ } f'(x) = 0 &\implies -1 + 2e^{-x} = 0 \\ \implies e^{-x} &= \frac{1}{2} \\ -x &= \ln\left(\frac{1}{2}\right) = -\ln 2 \\ \implies x &= \ln 2 \end{aligned}$$

- បើ $x < \ln 2 \implies -x > -\ln 2$
 $\implies e^{-x} > \frac{1}{2}$
 $\implies f'(x) > 0$ (អនុគមន៍កើន)

- បើ $x > \ln 2 \implies -x < -\ln 2$
 $\implies e^{-x} < \frac{1}{2}$
 $\implies f'(x) < 0$ (អនុគមន៍ថយ)

គណនាតម្លៃអតិបរមារបស់ f ៖

អនុគមន៍មានតម្លៃអតិបរមាត្រង់ $x = \ln 2$ គឺ

$$\begin{aligned} f(\ln 2) &= 4 - \ln 2 - 2e^{-\ln 2} \\ &= 4 - \ln 2 - 2\left(\frac{1}{2}\right) \\ &= 4 - \ln 2 - 1 = 3 - \ln 2 \quad (\approx 2.31) \end{aligned}$$

តារាងអថេរភាពនៃអនុគមន៍ f ៖

x	$-\infty$	$\ln 2$	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-
$f(x)$	$-\infty$	$3 - \ln 2$	$-\infty$

ខ រកសមីការបន្ទាត់ប៉ះ (T) ត្រង់ចំណុច A

សមីការបន្ទាត់ (T) : $y = f'(0)(x - 0) + f(0)$

- $f'(0) = -1 + 2e^0 = -1 + 2 = 1$

- $f(0) = 4 - 0 - 2e^0 = 4 - 2 = 2 \implies A(0, 2)$

គេបាន (T) $y = 1(x - 0) + 2 \implies y = x + 2$

គ បង្ហាញថា $f(x) = 0$ មានចម្លើយតែមួយគត់ $\beta \in [-1, 0]$

- អនុគមន៍ f ជាប់ និងកើនដាច់ខាតលើចន្លោះ $[-1, 0]$

ព្រោះគ្រប់ $x \in [-1, 0]$ នាំឱ្យ $f'(x) > 0$

- គេមាន

$$f(-1) = 4 - (-1) - 2e^{-(-1)}$$

$$= 5 - 2e$$

$$\approx 5 - 2(2.718) = -0.44 < 0$$

$$f(0) = 4 - 0 - 2e^0 = 2 > 0$$

ដោយ $f(-1) \times f(0) < 0$

តាមទ្រឹស្តីបទតម្លៃកណ្តាល សមីការ $f(x) = 0$ មានចម្លើយតែមួយគត់ β នៅក្នុងចន្លោះ $[-1, 0]$ ។

ឃ សង់បន្ទាត់ប៉ះ (T) អាស៊ីមតូត (D) និងក្រាប (C) ៖

តារាងតម្លៃលេខ

x	0	4
$y = -x + 4$	4	0

x	0	-2
$y = x + 2$	2	0

x	-1	0	$\ln 2$	2
$y = f(x)$	$5 - 2e$	2	$3 - \ln 2$	$2 - \frac{2}{e^2}$

