

ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាធុនតូច
 សម័យប្រឡង ២៨ មីនា ២០២៥
 វិញ្ញាសា គណិតវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)
 រយៈពេល ១៥០ នាទី
 ពិន្ទុ ១២៥

មណ្ឌលប្រឡង.....
 លេខបន្ទប់..... លេខតុ.....
 ឈ្មោះបេក្ខជន.....
 ហត្ថលេខាបេក្ខជន.....

ប្រធាន

- I. (១៥ពិន្ទុ) គណនាលីមីត a. $\lim_{x \rightarrow 1} (\sqrt{x^2 - 1} + 3x)$ b. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{4x} - 1}{e^x - 1}$ c. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2 - \sqrt{x + 2}}{x^3 - 8}$ d. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{x - \frac{\pi}{3}}{\sin x - \sqrt{3} \cos x}$
- II. (១០ពិន្ទុ) នៅក្នុងប្រអប់មួយមានកូនឃ្លីទាំងអស់ចំនួន $4n$ ។ ដែលក្នុងនោះមានកូនឃ្លីចំនួន $(2n + 1)$ មានពណ៌លឿង និង $(2n - 1)$ មានពណ៌បៃតង ។ គេចាប់យកកូនឃ្លីពីរប្រមាញ់ដោយចៃដន្យ ។ ក្នុងសំណួរនេះយើងកំណត់យក $n = 10$ ។
 គណនាប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ខាងក្រោម៖
 A: «កូនឃ្លីទាំងពីរដែលចាប់បានមានពណ៌ខុសគ្នា»
 B: «កូនឃ្លីទាំងពីរដែលចាប់បានមានពណ៌បៃតង» C: «កូនឃ្លីទាំងពីរដែលចាប់បានមានពណ៌ដូចគ្នា»
- III. (១៥ពិន្ទុ) គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z_1 = \sqrt{3} - i$, $z_2 = 2(1 - i)$ និង $Z = \frac{z_1^7}{z_2^6}$ ។ រកម៉ូឌុល និងអាក្យុយម៉ង់នៃ z_1 , z_2 និង Z រួចសរសេរ z_1 , z_2 និង Z ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ។ សរសេរ Z ជាទម្រង់ពីជគណិត ។
- IV. (១៥ពិន្ទុ) គណនាអាំងតេក្រាល៖ $I = \int_0^1 (x^2 + 2 - x^3) dx$ ។ គណនាអាំងតេក្រាល $J_1 = \int_0^1 \frac{x dx}{1 + x^2}$ ។ គេមាន $J_2 = \int_0^1 \frac{x^3}{1 + x^2} dx$ ។
 គណនា $J_1 + J_2$ និងទាញរកតម្លៃ J_2 ។ គណនាអាំងតេក្រាល $K = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin^2 x \cos^4 x + \sin^4 x \cos^2 x) dx$ ។
- V. (១០ពិន្ទុ) a. ដោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល (E) : $y'' = 3y - 2y'$ ។
 b. រកចម្លើយពិសេសមួយនៃសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល (E) ដែល $y(0) = 1$ និង $y'(1) = e^1$ (e ជាចំនួនពិតដែល $\ln e = 1$) ។
- VI. (២០ពិន្ទុ) A. នៅក្នុងលំហប្រដាប់ដោយតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ គេមានចំណុច $A(1, -2, 0)$, $B(-2, 0, 1)$, $C(-2, -1, 2)$, $D(-2, 1, -2)$, $E(2, 5, -2)$, $F(-1, 0, -2)$ ។
 ក គណនាវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{AE}$, $\overrightarrow{BD}$, $\overrightarrow{BF}$, $\overrightarrow{DF}$ ។
 ខ បង្ហាញថាត្រីកោណ ACE កែងត្រង់ A និងត្រីកោណ BDF សម័ង្ស ។
 B. ប៉ារ៉ាបូលមួយមានកំណុំ F នៅលើអ័ក្សអាប់ស៊ីស និងកំពូល $O(0, 0)$ ។ រកសមីការស្តង់ដាររបស់ប៉ារ៉ាបូលនេះ បើវាឆ្លងកាត់តាមចំណុច $A(2, 4)$ ។ រកតម្លៃ x_1 បើ $B(x_1, -8)$ នៅលើប៉ារ៉ាបូលនេះ ។
- VII. (៤០ពិន្ទុ) គេមានអនុគមន៍ g ដែល $g(x) = \ln \left(\frac{-x - 3}{x - 3} \right)$ ។
 ក រកដែនកំណត់នៃអនុគមន៍ g និងសិក្សាភាពជាអនុគមន៍តូ ឬអនុគមន៍សេស?
 (g ជាអនុគមន៍តូ លុះត្រាតែ $g(-x) = g(x)$ និង g ជាអនុគមន៍សេស លុះត្រាតែ $g(-x) = -g(x)$) ។
 ខ គណនាលីមីតនៃអនុគមន៍ g ត្រង់ -3 និងត្រង់ $+3$ ។ សិក្សាអថេរភាពនៃ g លើដែនកំណត់របស់វា ។ សង់តារាងអថេរភាពរបស់វា ។
 គ $(O, \vec{i}, \vec{j})$ ជាតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ ។ តាង C ក្រាបនៃអនុគមន៍ g ក្នុងតម្រុយនេះ ។ កំណត់សមីការបន្ទាត់ប៉ះ T ទៅនឹងក្រាប C ត្រង់ចំណុចដែលមានអាប់ស៊ីស 0 ។ សង់ក្រាប C និងបន្ទាត់ប៉ះ T ។ សិក្សាសញ្ញានៃ $g(x)$ ទៅតាមតម្លៃនៃ x ។
 ឃ a. គណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍ h ដែល $h(x) = xg(x)$ ។
 b. រកផ្ទៃក្រឡានៃផ្ទៃក្បូងនៅចន្លោះក្រាប C អ័ក្សអាប់ស៊ីស និងបន្ទាត់ដែលមានសមីការ $x = 0$ និង $x = 1$ ។

I. (១៥ពិន្ទុ) គណនាលីមីត

a. $\lim_{x \rightarrow 1} (\sqrt{x^2 - 1} + 3x)$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} (\sqrt{x^2 - 1} + 3x) &= \sqrt{1^2 - 1} + 3(1) \\ &= \sqrt{0} + 3 \\ &= 3 \end{aligned}$$

b. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{4x} - 1}{e^x - 1}$ រាងមិនកំណត់ $\frac{0}{0}$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{4x} - 1}{e^x - 1} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^{2x} - 1)(e^{2x} + 1)}{e^x - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^x - 1)(e^x + 1)(e^{2x} + 1)}{e^x - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} (e^x + 1)(e^{2x} + 1) \\ &= (e^0 + 1)(e^0 + 1) \\ &= (1 + 1)(1 + 1) = 4 \end{aligned}$$

c. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2 - \sqrt{x+2}}{x^3 - 8}$ រាងមិនកំណត់ $\frac{0}{0}$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2} \frac{2 - \sqrt{x+2}}{x^3 - 8} &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(2 - \sqrt{x+2})(2 + \sqrt{x+2})}{(x-2)(x^2 + 2x + 4)(2 + \sqrt{x+2})} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{4 - (x+2)}{(x-2)(x^2 + 2x + 4)(2 + \sqrt{x+2})} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{2 - x}{(x-2)(x^2 + 2x + 4)(2 + \sqrt{x+2})} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{-(x-2)}{(x-2)(x^2 + 2x + 4)(2 + \sqrt{x+2})} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{-1}{(x^2 + 2x + 4)(2 + \sqrt{x+2})} \\ &= \frac{-1}{(2^2 + 2(2) + 4)(2 + \sqrt{2+2})} \\ &= \frac{-1}{(4 + 4 + 4)(2 + 2)} = \frac{-1}{12(4)} = -\frac{1}{48} \end{aligned}$$

d. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{x - \frac{\pi}{3}}{\sin x - \sqrt{3} \cos x}$ រាងមិនកំណត់ $\frac{0}{0}$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{x - \frac{\pi}{3}}{\sin x - \sqrt{3} \cos x} &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{x - \frac{\pi}{3}}{2 \left(\frac{1}{2} \sin x - \frac{\sqrt{3}}{2} \cos x \right)} \\ &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{x - \frac{\pi}{3}}{2 \left(\sin x \cos \frac{\pi}{3} - \cos x \sin \frac{\pi}{3} \right)} \\ &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{x - \frac{\pi}{3}}{2 \sin \left(x - \frac{\pi}{3} \right)} \end{aligned}$$

តាង $t = x - \frac{\pi}{3}$ កាលណា $x \rightarrow \frac{\pi}{3}$ នោះ $t \rightarrow 0$

$$= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{2 \sin t} = \frac{1}{2} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{\sin t} = \frac{1}{2} (1) = \frac{1}{2}$$

II. (១០ពិន្ទុ)

ចំពោះ $n = 10$ យើងបាន៖

- ចំនួនកូនឆ្លីសរុប៖ $4n = 4(10) = 40$ គ្រាប់
- ចំនួនកូនឆ្លីពណ៌លឿង៖ $2n + 1 = 2(10) + 1 = 21$ គ្រាប់
- ចំនួនកូនឆ្លីពណ៌បៃតង៖ $2n - 1 = 2(10) - 1 = 19$ គ្រាប់

ចំនួនករណីអាច $n(S) = C(40, 2) = \frac{40 \times 39}{2} = 780$

- A: «កូនឆ្លីទាំងពីរដែលចាប់បានមានពណ៌ខុសគ្នា»
 $n(A) = C(21, 1) \times C(19, 1) = 21 \times 19 = 399$
 $P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{399}{780} = \frac{133}{260}$
- B: «កូនឆ្លីទាំងពីរដែលចាប់បានមានពណ៌បៃតង»
 $n(B) = C(19, 2) = \frac{19 \times 18}{2} = 171$
 $P(B) = \frac{n(B)}{n(S)} = \frac{171}{780} = \frac{57}{260}$
- C: «កូនឆ្លីទាំងពីរដែលចាប់បានមានពណ៌ដូចគ្នា»

$$\begin{aligned} P(C) &= 1 - P(A) \\ &= 1 - \frac{133}{260} \\ &= \frac{127}{260} \end{aligned}$$

III. (១៥ពិន្ទុ)

១. រកម៉ូឌុល អាកុយម៉ង់ និងទម្រង់ត្រីកោណមាត្រនៃ z_1 និង z_2

ចំពោះ $z_1 = \sqrt{3} - i$

$$|z_1| = \sqrt{(\sqrt{3})^2 + (-1)^2} = \sqrt{3+1} = \sqrt{4} = 2$$

$$\cos \theta_1 = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \sin \theta_1 = -\frac{1}{2} \implies \theta_1 = -\frac{\pi}{6}$$

ដូចនេះ $z_1 = 2 \left[\cos \left(-\frac{\pi}{6} \right) + i \sin \left(-\frac{\pi}{6} \right) \right]$ ។

ចំពោះ $z_2 = 2(1 - i) = 2 - 2i$

$$|z_2| = \sqrt{2^2 + (-2)^2} = \sqrt{4+4} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$$

$$\cos \theta_2 = \frac{2}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\sin \theta_2 = -\frac{2}{2\sqrt{2}} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\implies \theta_2 = -\frac{\pi}{4}$$

ដូចនេះ $z_2 = 2\sqrt{2} \left[\cos \left(-\frac{\pi}{4} \right) + i \sin \left(-\frac{\pi}{4} \right) \right]$ ។

២. រកម៉ូឌុល អាកុយម៉ង់ និងទម្រង់ត្រីកោណមាត្រនៃ $Z = \frac{z_1^7}{z_2^6}$

តាមលក្ខណៈម៉ូឌុល និងអាកុយម៉ង់នៃចំនួនកុំផ្លិច យើងបាន៖

$$|Z| = \frac{|z_1|^7}{|z_2|^6} = \frac{2^7}{(2\sqrt{2})^6} = \frac{128}{(2^{\frac{3}{2}})^6} = \frac{128}{2^9} = \frac{128}{512} = \frac{1}{4}$$

$$\arg(Z) = 7 \arg(z_1) - 6 \arg(z_2)$$

$$= 7 \left(-\frac{\pi}{6} \right) - 6 \left(-\frac{\pi}{4} \right)$$

$$= -\frac{7\pi}{6} + \frac{6\pi}{4}$$

$$= -\frac{7\pi}{6} + \frac{9\pi}{6} = \frac{2\pi}{6} = \frac{\pi}{3}$$

$$\text{ដូចនេះ } Z = \frac{1}{4} \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right) \text{ ។}$$

៣. សរសេរ Z ជាទម្រង់ពីជគណិត

$$Z = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} \right)$$

$$= \frac{1}{8} + i \frac{\sqrt{3}}{8}$$

$$\text{ដូចនេះ } Z = \frac{1}{8} + i \frac{\sqrt{3}}{8} \text{ ។}$$

IV. (១៥ពិន្ទុ)

១. គណនាអាំងតេក្រាល $I = \int_0^1 (x^2 + 2 - x^3) dx$

$$I = \int_0^1 (x^2 + 2 - x^3) dx$$

$$= \left[\frac{x^3}{3} + 2x - \frac{x^4}{4} \right]_0^1$$

$$= \left(\frac{1^3}{3} + 2(1) - \frac{1^4}{4} \right) - 0$$

$$= \frac{1}{3} + 2 - \frac{1}{4}$$

$$= \frac{4 + 24 - 3}{12} = \frac{25}{12}$$

២. គណនាអាំងតេក្រាល $J_1 = \int_0^1 \frac{x dx}{1+x^2}$

$$\text{តាង } u = 1 + x^2 \implies du = 2x dx \implies x dx = \frac{1}{2} du$$

$$\text{បើ } x = 0 \implies u = 1 \text{ និង } x = 1 \implies u = 2$$

$$J_1 = \int_1^2 \frac{\frac{1}{2} du}{u}$$

$$= \frac{1}{2} [\ln |u|]_1^2$$

$$= \frac{1}{2} (\ln 2 - \ln 1)$$

$$= \frac{1}{2} \ln 2 \quad (\text{ព្រោះ } \ln 1 = 0)$$

៣. គណនា $J_1 + J_2$ និងទាញរកតម្លៃ J_2

$$J_1 + J_2 = \int_0^1 \frac{x}{1+x^2} dx + \int_0^1 \frac{x^3}{1+x^2} dx$$

$$= \int_0^1 \frac{x + x^3}{1+x^2} dx = \int_0^1 \frac{x(1+x^2)}{1+x^2} dx$$

$$= \int_0^1 x dx = \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^1 = \frac{1}{2}$$

ទាញរកតម្លៃ J_2 ៖

$$J_2 = (J_1 + J_2) - J_1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \ln 2 = \frac{1 - \ln 2}{2}$$

៤. គណនា $K = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin^2 x \cos^4 x + \sin^4 x \cos^2 x) dx$

$$\sin^2 x \cos^4 x + \sin^4 x \cos^2 x$$

$$= \sin^2 x \cos^2 x (\cos^2 x + \sin^2 x)$$

$$= \sin^2 x \cos^2 x \quad (\text{ព្រោះ } \sin^2 x + \cos^2 x = 1)$$

$$= (\sin x \cos x)^2 = \left(\frac{1}{2} \sin 2x \right)^2 = \frac{1}{4} \sin^2 2x$$

$$= \frac{1}{4} \left(\frac{1 - \cos 4x}{2} \right) = \frac{1}{8} (1 - \cos 4x)$$

នាំឱ្យយើងបាន៖

$$K = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{8} (1 - \cos 4x) dx$$

$$= \frac{1}{8} \left[x - \frac{\sin 4x}{4} \right]_0^{\frac{\pi}{2}}$$

$$= \frac{1}{8} \left[\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\sin(2\pi)}{4} \right) - 0 \right]$$

$$= \frac{1}{8} \left(\frac{\pi}{2} \right) = \frac{\pi}{16} \quad (\text{ព្រោះ } \sin(2\pi) = 0)$$

V. (១០ពិន្ទុ)

a. ដោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $(E) : y'' = 3y - 2y'$

$$\text{យើងអាចសរសេរ } (E) : y'' + 2y' - 3y = 0$$

$$\text{សមីការសម្គាល់ } r^2 + 2r - 3 = 0$$

$$(r - 1)(r + 3) = 0$$

$$r_1 = 1, \quad r_2 = -3$$

ដូចនេះ ចម្លើយទូទៅនៃសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលគឺ៖

$$y(x) = C_1 e^x + C_2 e^{-3x} \quad (\text{ដែល } C_1, C_2 \in \mathbb{R}) \text{ ។}$$

b. រកចម្លើយពិសេសមួយនៃសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល (E)

$$\text{គេមានលក្ខខណ្ឌដើម } y(0) = 1 \text{ និង } y'(1) = e^1 = e$$

$$\text{គេបាន } y'(x) = C_1 e^x - 3C_2 e^{-3x}$$

- ចំពោះ $y(0) = 1$ ៖

$$C_1 e^0 + C_2 e^0 = 1 \implies C_1 + C_2 = 1 \implies C_2 = 1 - C_1$$

- ចំពោះ $y'(1) = e$ ៖

$$C_1 e^1 - 3C_2 e^{-3(1)} = e \implies C_1 e - 3C_2 e^{-3} = e \quad (I)$$

ជំនួស $C_2 = 1 - C_1$ ចូលក្នុងសមីការ (I)

$$C_1 e - 3(1 - C_1) e^{-3} = e$$

$$C_1 e - 3e^{-3} + 3C_1 e^{-3} = e$$

$$C_1 (e + 3e^{-3}) - 3e^{-3} = e$$

$$C_1 (e + 3e^{-3}) = e + 3e^{-3}; C_1 = 1$$

នាំឱ្យយើងទាញរកតម្លៃ C_2 បាន $C_2 = 1 - 1 = 0$

យើងបានចម្លើយពិសេស $y(x) = 1e^x + 0e^{-3x} = e^x$

ដូចនេះ ចម្លើយពិសេសដែលត្រូវរកគឺ $y(x) = e^x$ ។

VI. (២០ពិន្ទុ)

A. a. គណនាវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AE}, \overrightarrow{BD}, \overrightarrow{BF}, \overrightarrow{DF}$ ៖

$$\overrightarrow{AC} = (-2 - 1, -1 - (-2), 2 - 0) = (-3, 1, 2)$$

$$\overrightarrow{AE} = (2 - 1, 5 - (-2), -2 - 0) = (1, 7, -2)$$

$$\overrightarrow{BD} = (-2 - (-2), 1 - 0, -2 - 1) = (0, 1, -3)$$

$$\overrightarrow{BF} = (-1 - (-2), 0 - 0, -2 - 1) = (1, 0, -3)$$

$$\overrightarrow{DF} = (-1 - (-2), 0 - 1, -2 - (-2)) = (1, -1, 0)$$

b. បង្ហាញពីលក្ខណៈនៃត្រីកោណ៖

ក បង្ហាញថាត្រីកោណ ACE កែងត្រង់ A ៖

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AE} &= (-3)(1) + (1)(7) + (2)(-2) \\ &= -3 + 7 - 4 = 0\end{aligned}$$

ដោយ $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AE} = 0$ នាំឱ្យ $\overrightarrow{AC} \perp \overrightarrow{AE}$ ។

ដូចនេះ ត្រីកោណ ACE ជាត្រីកោណកែងត្រង់ A ។

ខ ពិនិត្យលក្ខណៈត្រីកោណ BDF ៖

$$BD = \|\overrightarrow{BD}\| = \sqrt{0^2 + 1^2 + (-3)^2} = \sqrt{1 + 9} = \sqrt{10}$$

$$BF = \|\overrightarrow{BF}\| = \sqrt{1^2 + 0^2 + (-3)^2} = \sqrt{1 + 9} = \sqrt{10}$$

$$DF = \|\overrightarrow{DF}\| = \sqrt{1^2 + (-1)^2 + 0^2} = \sqrt{1 + 1} = \sqrt{2}$$

$$\text{ដោយ } BD = BF = \sqrt{10}$$

នោះ BDF គឺជាត្រីកោណសមបាតត្រង់ B ។

B. រកសមីការស្តង់ដារបស់ប៉ារ៉ាបូល

$$\text{សមីការស្តង់ដារមានទម្រង់ } y^2 = 4px$$

ម្យ៉ាងប៉ារ៉ាបូលនេះកាត់តាមចំណុច $A(2, 4)$

$$4^2 = 4p(2) \implies 16 = 8p \implies p = 2$$

ដូចនេះសមីការស្តង់ដារបស់ប៉ារ៉ាបូល $y^2 = 8x$ ។

រកតម្លៃ x_1 បើចំណុច $B(x_1, -8)$ ស្ថិតនៅលើប៉ារ៉ាបូល៖

$$\text{យើងបាន } (-8)^2 = 8x_1 \implies 64 = 8x_1 \implies x_1 = \frac{64}{8} = 8$$

ដូចនេះ តម្លៃ $x_1 = 8$ ។

VII. (៤០ពិន្ទុ)

ក រកដែនកំណត់នៃអនុគមន៍ g និងសិក្សាភាពគូសេស

• រកដែនកំណត់៖

$$\begin{aligned}\text{អនុគមន៍ } g(x) &= \ln \left(\frac{-x-3}{x-3} \right) \text{ មានន័យលុះត្រាតែ៖} \\ \frac{-x-3}{x-3} &> 0 \quad \text{និង} \quad x-3 \neq 0\end{aligned}$$

x	$-\infty$	-3	3	$+\infty$
$-x-3$	+	0	-	-
$x-3$	-	-	0	+
$\frac{-x-3}{x-3}$	-	0	+	-

ដូចនេះ ដែនកំណត់នៃអនុគមន៍គឺ៖ $D_g = (-3, 3)$ ។

• សិក្សាភាពជាអនុគមន៍គូសេស ឬអនុគមន៍សេស៖

$$\text{គ្រប់ } x \in (-3, 3) \implies -x \in (-3, 3)$$

យើងគណនា $g(-x)$ ៖

$$\begin{aligned}g(-x) &= \ln \left(\frac{-(-x)-3}{(-x)-3} \right) \\ &= \ln \left(\frac{x-3}{-x-3} \right) \\ &= \ln \left(\frac{-x-3}{x-3} \right)^{-1} \\ &= -\ln \left(\frac{-x-3}{x-3} \right) = -g(x)\end{aligned}$$

ដូចនេះ g ជាអនុគមន៍សេស ។

ខ គណនាលីមីត អថេរភាព និងតារាងអថេរភាព

• គណនាលីមីតត្រង់ចុងដែនកំណត់៖

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow -3^+} g(x) &= \lim_{x \rightarrow -3^+} \ln \left(\frac{-x-3}{x-3} \right) \\ &= \ln \left(\frac{0^+}{-6} \right) = \ln(0^+) = -\infty\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 3^-} g(x) &= \lim_{x \rightarrow 3^-} \ln \left(\frac{-x-3}{x-3} \right) \\ &= \ln \left(\frac{-6}{0^-} \right) = \ln(+\infty) = +\infty\end{aligned}$$

ដូចនេះ បន្ទាត់ $x = -3$ និង $x = 3$ ជាអាស៊ីមតូតឈរនៃ

ក្រាប C ។

• គណនាដេរីវេ $g'(x)$ ៖

$$\begin{aligned}\text{តាង } u(x) &= \frac{-x-3}{x-3} \text{ នាំឱ្យ} \\ u'(x) &= \frac{(-1)(x-3) - 1(-x-3)}{(x-3)^2} \\ &= \frac{-x+3+x+3}{(x-3)^2} = \frac{6}{(x-3)^2}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}g'(x) &= \frac{u'(x)}{u(x)} = \frac{\frac{6}{(x-3)^2}}{\frac{-x-3}{x-3}} \\ &= \frac{6}{(x-3)^2} \left(\frac{x-3}{-x-3} \right) \\ &= \frac{6}{(x-3)(-x-3)} = \frac{6}{9-x^2}\end{aligned}$$

ចំពោះគ្រប់ $x \in (-3, 3)$ យើងបាន $9 - x^2 > 0$

នាំឱ្យ $g'(x) > 0$ ជានិច្ច។

ដូចនេះ g ជាអនុគមន៍កើនដាច់ខាតលើដែន D_g ។

តារាងអថេរភាពនៃ g

x	-3	0	3
$g'(x)$		+	
$g(x)$			

គ សមីការបន្ទាត់ប៉ះ សញ្ញានៃ $g(x)$ និងការសង់ក្រាប សមីការបន្ទាត់ប៉ះ T ត្រង់ $x = 0$ ៖

$$ទម្រង់ទូទៅ៖ y = g'(0)(x - 0) + g(0)$$

$$យើងមាន $g(0) = \ln\left(\frac{-3}{-3}\right) = \ln(1) = 0$$$


$$\text{និង } g'(0) = \frac{6}{9 - 0^2} = \frac{2}{3}$$

$$\text{ដូចនេះ សមីការបន្ទាត់ប៉ះគឺ៖ } T : y = \frac{2}{3}x$$

ការសង់ក្រាប C និងបន្ទាត់ T ៖

x	-3	0
y	-2	0

x	-2	-1	1	2
y	$-\ln 5$	$-\ln 2$	$\ln 2$	$\ln 5$



សិក្សាសញ្ញានៃ $g(x)$ ៖

ដោយសារ $g(0) = 0$ ហើយ g ជាអនុគមន៍កើន នាំឱ្យ៖

$$\bullet \text{ បើ } -3 < x < 0 \implies g(x) < 0$$

$$\bullet \text{ បើ } x = 0 \implies g(x) = 0$$

$$\bullet \text{ បើ } 0 < x < 3 \implies g(x) > 0$$

ឃ គណនាដេរីវេ និងរកផ្ទៃក្រឡា

• a. គណនាដេរីវេនៃ $h(x) = xg(x)$ ៖

តាមរូបមន្ត $(uv)' = u'v + uv'$ យើងបាន៖

$$\begin{aligned} h'(x) &= (x)'g(x) + xg'(x) \\ &= 1g(x) + x\left(\frac{6}{9-x^2}\right) \\ &= g(x) + \frac{6x}{9-x^2} \end{aligned}$$

• b. រកផ្ទៃក្រឡានៃផ្នែកប្លង់៖

លើចន្លោះ $[0, 1]$ អនុគមន៍ $g(x) \geq 0$

$$\text{នោះផ្ទៃក្រឡា } S \text{ គឺ៖ } S = \int_0^1 g(x) dx$$

$$\text{យើងមាន } g(x) = h'(x) - \frac{6x}{9-x^2} \text{ នាំឱ្យ៖}$$

$$S = \int_0^1 \left(h'(x) - \frac{6x}{9-x^2} \right) dx$$

$$= [h(x)]_0^1 - \int_0^1 \frac{6x}{9-x^2} dx$$

$$\text{តាង } t = 9 - x^2 \implies dt = -2x dx$$

$$\implies 6x dx = -3 dt$$

$$\text{បើ } x = 0 \implies t = 9 \text{ និង } x = 1 \implies t = 8$$

$$\int_0^1 \frac{6x}{9-x^2} dx = \int_9^8 \frac{-3 dt}{t}$$

$$= -3 [\ln |t|]_9^8$$

$$= -3(\ln 8 - \ln 9)$$

$$= 3(\ln 9 - \ln 8)$$

$$= 3 \ln \left(\frac{9}{8} \right)$$

$$\text{គណនា } [h(x)]_0^1$$

$$= h(1) - h(0) = 1g(1) - 0$$

$$= \ln \left(\frac{-4}{-2} \right) = \ln 2$$

នាំឱ្យយើងបានផ្ទៃក្រឡាសរុបគឺ៖

$$S = \ln 2 - 3 \ln \left(\frac{9}{8} \right)$$

$$= \ln 2 - (3 \ln 9 - 3 \ln 8)$$

$$= \ln 2 - 3 \ln(3^2) + 3 \ln(2^3)$$

$$= \ln 2 - 6 \ln 3 + 9 \ln 2$$

$$= 10 \ln 2 - 6 \ln 3 \quad (\text{ឯកតាផ្ទៃ})$$