

ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាធុនតូច

សម័យប្រឡង ០៨ តុលា ២០២៤

វិញ្ញាសា គណិតវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)

រយៈពេល ១៥០ នាទី

ពិន្ទុ ១២៥

មណ្ឌលប្រឡង.....

លេខបន្ទប់..... លេខគុ.....

ឈ្មោះបេក្ខជន.....

ឋានៈលេខាបេក្ខជន.....

ប្រធាន

- I. (១៥ពិន្ទុ) គណនាលីមីត $a. \lim_{x \rightarrow 0} (2e^{3x} - xe^{2x} + 2e^x + 4)$ $b. \text{រកតម្លៃ } a \text{ ដែល } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{8x^2 - x + 1}{ax^2 + 8} = 1$
- $c. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \sin x \cos x}{x^3}$ $d. \lim_{x \rightarrow -\infty} (x + \sqrt{x^2 + 9})$

- II. (១០ពិន្ទុ) ក្នុងផ្ទាំងរៀងនៃសាលាអន្តរជាតិមួយមានសិស្ស ២៤នាក់ ដែលក្នុងនោះ ៣នាក់ជាជនជាតិអង់គ្លេស ២ នាក់ជាជនជាតិបារាំង ៥នាក់ជាជនជាតិចិន ៤នាក់ជាជនជាតិកូរ៉េ និង១០នាក់ជាជនជាតិខ្មែរ។ គេជ្រើសរើសសិស្ស ៣នាក់ដោយចៃដន្យ ជាតំណាងថ្នាក់យកទៅប្រកួតក្នុងកម្មវិធីមួយ។ រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ទាំងបី៖
- A “សិស្សទាំងបីនាក់សុទ្ធតែជាជនជាតិនៅទ្វីបអឺរ៉ុប”
- B “សិស្សទាំងបីនាក់សុទ្ធតែជាជនជាតិនៅទ្វីបអាស៊ី តែមិនមែនជាខ្មែរ”
- C “សិស្សទាំងបីនាក់មានម្នាក់ជាជនជាតិខ្មែរ ម្នាក់ជាជនជាតិនៅទ្វីបអឺរ៉ុប និងម្នាក់ទៀតជាជនជាតិនៅទ្វីបអាស៊ី តែមិនមែនជាខ្មែរ”។

- III. (១៥ពិន្ទុ) គណនាអាំងតេក្រាល $I = \int_1^e \left[2x - 1 + \frac{\ln x}{x} \right] dx$ $J = \int_1^2 \frac{6x^2 + 4x}{x^3 + x^2 - 1} dx$
- $K = \int_0^1 (x^2 + 1)^7 x dx$ $L = \int_0^{\frac{\pi}{4}} (2 \cos 2x - \cos 4x) dx$

- IV. (១៥ពិន្ទុ) នៅក្នុងសំណុំចំនួនកុំផ្លិច $\mathbb{C}$ ។ a. ដោះស្រាយសមីការ $2z + (1 + i)\bar{z} = -1 + 5i$ ។ គណនា i^{2025} ។
- b. យើងមាន $z_1 = -4$; $z_2 = 3 + i$ ។ គណនា $z_1 + z_2$ រួចសរសេរ $z_1 + z_2$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ។

- V. (១៥ពិន្ទុ) គេមានសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $(E) : y' + y = e^{-x}$ ។

1. បង្ហាញថាអនុគមន៍ u កំណត់លើសំណុំចំនួនពិត $\mathbb{R}$ ដោយ $u(x) = xe^{-x}$ ជាចម្លើយរបស់សមីការ (E) ។
2. គេមានសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $(E') : y' + y = 0$ ។ ដោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល (E') ។
3. v ជាអនុគមន៍កំណត់ និងមានដេរីវេលើ $\mathbb{R}$ ។ បង្ហាញថាអនុគមន៍ v ជាចម្លើយមួយនៃ (E) លុះត្រាតែអនុគមន៍ $v - u$ ជាចម្លើយមួយរបស់សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល (E') ។ ទាញយកចម្លើយរបស់សមីការ (E) ។

- VI. (២០ពិន្ទុ) 1. ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ គេមានចំណុច $A(2, 0, 0)$, $B(-1, \sqrt{3}, 0)$ និង $C(-1, -\sqrt{3}, 0)$ ។ រកវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{BC}$ ។ បង្ហាញថាត្រីកោណ ABC ជាត្រីកោណសម័ង្ស និងរកក្រឡាផ្ទៃរបស់វា។

2. គេមានសមីការ $(2x - 3y)^2 = 6(3y^2 - 2xy - 6)$ ។ បង្ហាញថាសមីការនេះជាសមីការអ៊ីបេរបូល។
- កំណត់កូអរដោនេនៃកំពូល និងកំណុំនៃអ៊ីបេរបូល។ រកសមីការអាស៊ីមតូតរបស់អ៊ីបេរបូល និងសង់អ៊ីបេរបូលនេះ។

- VII. (៣៥ពិន្ទុ) គេមានអនុគមន៍ f កំណត់លើ $(1, +\infty)$ ដោយ $f(x) = \ln(x+1) - \ln(x-1) - x + 2$ ។ គេតាង (C) ជាក្រាបរបស់អនុគមន៍ f នៅក្នុងប្លង់ប្រដាប់ដោយតម្រុយអរតូណរមេ $(O, \vec{i}, \vec{j})$ ។

1. បង្ហាញថា $f(x) = 2 - x + \ln\left(\frac{x+1}{x-1}\right)$ ។ គណនាលីមីតនៃអនុគមន៍ f ត្រង់ 1 និងត្រង់ $+\infty$ ។
2. បង្ហាញថានៅលើ $(1, +\infty)$ ដេរីវេនៃអនុគមន៍ f គឺ $f'(x) = \frac{-(x^2 + 1)}{(x+1)(x-1)}$ ។ សិក្សាអថេរភាពនៃ f និងសង់តារាងអថេរភាពនៃ f ។
3. បង្ហាញថាបន្ទាត់ប៉ះ d ដែលមានសមីការ $y = -x + 2$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប (C) ។
4. ប្រៀបធៀបទីតាំងនៃក្រាប (C) ធៀបនឹងបន្ទាត់ (d) ។ សង់ក្រាប (C) និង (d) ។ (ប្រើតម្លៃ $\ln 3 \approx 1.1$)

I. (១៥ពិន្ទុ) គណនាលីមីត

a. គណនាលីមីត $\lim_{x \rightarrow 0} (2e^{3x} - xe^{2x} + 2e^x + 4)$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} (2e^{3x} - xe^{2x} + 2e^x + 4) &= 2e^{3(0)} - 0e^{2(0)} + 2e^0 + 4 \\ &= 2(1) - 0 + 2(1) + 4 \\ &= 2 + 2 + 4 = 8 \end{aligned}$$

ដូចនេះ $\lim_{x \rightarrow 0} (2e^{3x} - xe^{2x} + 2e^x + 4) = 8$ ។

b. រកតម្លៃ a ដែល $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{8x^2 - x + 1}{ax^2 + 8} = 1$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{8x^2 - x + 1}{ax^2 + 8} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{8x^2}{ax^2} = \frac{8}{a}$$

ដោយ $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{8x^2 - x + 1}{ax^2 + 8} = 1$ នោះ $\frac{8}{a} = 1 \implies a = 8$

ដូចនេះ $a = 8$ ។

c. គណនាលីមីត $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \sin x \cos x}{x^3}$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \sin x \cos x}{x^3} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x(1 - \cos x)}{x^3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \right) \left(\frac{1 - \cos x}{x^2} \right) \\ &= 1 \left(\frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

ដូចនេះ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \sin x \cos x}{x^3} = \frac{1}{2}$ ។

d. គណនាលីមីត $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x + \sqrt{x^2 + 9})$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} (x + \sqrt{x^2 + 9}) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{(x + \sqrt{x^2 + 9})(x - \sqrt{x^2 + 9})}{x - \sqrt{x^2 + 9}} \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 - (x^2 + 9)}{x - \sqrt{x^2 + 9}} \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-9}{x - |x|\sqrt{1 + \frac{9}{x^2}}} \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-9}{x - (-x)\sqrt{1 + \frac{9}{x^2}}} \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-9}{x + x\sqrt{1 + \frac{9}{x^2}}} \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-9}{x(1 + \sqrt{1 + \frac{9}{x^2}})} \\ &= \frac{-9}{-\infty(1 + 1)} = 0 \end{aligned}$$

ដូចនេះ $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x + \sqrt{x^2 + 9}) = 0$ ។

II. (១០ពិន្ទុ)

១. រកចំនួនករណីអាច $n(S)$

$$n(S) = C(24, 3) = \frac{24 \times 23 \times 22}{3 \times 2 \times 1} = 2024 \text{ ករណី}$$

២. គណនាប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍នីមួយៗ

• គណនា $P(A)$

$$n(A) = C(5, 3) = \frac{5 \times 4 \times 3}{3 \times 2 \times 1} = 10 \text{ ករណី}$$

$$\text{គេបាន } P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{10}{2024} = \frac{5}{1012} \text{ ។}$$

• គណនា $P(B)$

$$n(B) = C(9, 3) = \frac{9 \times 8 \times 7}{3 \times 2 \times 1} = 84 \text{ ករណី}$$

$$\text{គេបាន } P(B) = \frac{n(B)}{n(S)} = \frac{84}{2024} = \frac{21}{506}$$

• គណនា $P(C)$

$$n(C) = C(10, 1) \times C(5, 1) \times C(9, 1) = 450 \text{ ករណី}$$

$$\text{គេបាន } P(C) = \frac{n(C)}{n(S)} = \frac{450}{2024} = \frac{225}{1012}$$

III. (១៥ពិន្ទុ) គណនាអាំងតេក្រាល

$$I = \int_1^e \left[2x - 1 + \frac{\ln x}{x} \right] dx$$

$$\begin{aligned} I &= \left[x^2 - x + \frac{1}{2}(\ln x)^2 \right]_1^e \\ &= \left(e^2 - e + \frac{1}{2}(\ln e)^2 \right) - \left(1^2 - 1 + \frac{1}{2}(\ln 1)^2 \right) \\ &= \left(e^2 - e + \frac{1}{2}(1)^2 \right) - (0 - 0 + 0) \\ &= e^2 - e + \frac{1}{2} \end{aligned}$$

ដូចនេះ $I = e^2 - e + \frac{1}{2}$ ។

$$\text{គណនា } J = \int_1^2 \frac{6x^2 + 4x}{x^3 + x^2 - 1} dx$$

តាង $u = x^3 + x^2 - 1 \implies du = (3x^2 + 2x) dx$

នាំឱ្យ $2 du = (6x^2 + 4x) dx$

• បើ $x = 1 \implies u = 1^3 + 1^2 - 1 = 1$

• បើ $x = 2 \implies u = 2^3 + 2^2 - 1 = 11$

$$J = \int_1^{11} \frac{2 du}{u} = 2 [\ln |u|]_1^{11} = 2(\ln 11 - \ln 1) = 2 \ln 11$$

ដូចនេះ $J = 2 \ln 11$ ។

$$\text{គណនា } K = \int_0^1 (x^2 + 1)^7 x dx$$

តាង $u = x^2 + 1 \implies du = 2x dx \implies x dx = \frac{1}{2} du$

• បើ $x = 0 \implies u = 0^2 + 1 = 1$

• បើ $x = 1 \implies u = 1^2 + 1 = 2$

$$K = \int_1^2 u^7 \left(\frac{1}{2} du \right) = \frac{1}{2} \left[\frac{u^8}{8} \right]_1^2 = \frac{1}{16} [u^8]_1^2$$

$$= \frac{1}{16} (2^8 - 1^8) = \frac{1}{16} (255) = \frac{255}{16}$$

$$\text{ដូចនេះ } K = \frac{255}{16} \text{ ។}$$

$$\text{គណនា } L = \int_0^{\frac{\pi}{4}} (2 \cos 2x - \cos 4x) dx$$

$$L = \left[\sin 2x - \frac{1}{4} \sin 4x \right]_0^{\frac{\pi}{4}}$$

$$= \left(\sin \left(2 \times \frac{\pi}{4} \right) - \frac{1}{4} \sin \left(4 \times \frac{\pi}{4} \right) \right) - \left(\sin 0 - \frac{1}{4} \sin 0 \right)$$

$$= \left(\sin \left(\frac{\pi}{2} \right) - \frac{1}{4} \sin(\pi) \right) - 0 = 1 - \frac{1}{4}(0) = 1$$

$$\text{ដូចនេះ } L = 1 \text{ ។}$$

IV. (១៥ពិន្ទុ)

a. ដោះស្រាយសមីការ និងគណនា i^{2025}

- ដោះស្រាយសមីការ $2z + (1+i)\bar{z} = -1 + 5i$

តាង $z = x + iy$ នាំឱ្យ $\bar{z} = x - iy$ ដែល $x, y \in \mathbb{R}$ ។

$$2(x + iy) + (1+i)(x - iy) = -1 + 5i$$

$$2x + 2iy + x - iy + ix - i^2y = -1 + 5i$$

$$2x + 2iy + x - iy + ix + y = -1 + 5i$$

$$(2x + x + y) + i(2y - y + x) = -1 + 5i$$

$$(3x + y) + i(x + y) = -1 + 5i$$

$$\text{យើងបានប្រព័ន្ធសមីការ} \begin{cases} 3x + y = -1 & (1) \\ x + y = 5 & (2) \end{cases}$$

ដកសមីការ (1) និង (2) អង្គនិងអង្គ យើងបាន៖

$$(3x + y) - (x + y) = -1 - 5$$

$$2x = -6$$

$$x = -3$$

$$\text{នាំឱ្យ } y = 5 + 3 = 8$$

ដូចនេះ ចម្លើយនៃសមីការគឺ៖ $z = -3 + 8i$ ។

- គណនា i^{2025} ៖

$$\text{គេបាន } i^{2025} = i^{4 \times 506 + 1} = (i^4)^{506} \times i^1 = (1)^{506} \times i = i$$

$$\text{ដូចនេះ } i^{2025} = i \text{ ។}$$

b. គណនា $z_1 + z_2$ រួចសរសេរជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ

- គណនា $z_1 + z_2$ ៖

យើងមាន $z_1 = -4$ និង $z_2 = 3 + i$ នាំឱ្យ

$$z_1 + z_2 = -4 + (3 + i) = -1 + i$$

- សរសេរ $z_1 + z_2$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ៖

$$\text{តាង } Z = z_1 + z_2 = -1 + i$$

$$\text{- រកម៉ូឌុល } r \text{ នៃ } Z \text{៖ } r = \sqrt{(-1)^2 + 1^2} = \sqrt{2}$$

$$\text{- រកអាកុយម៉ង់ } \theta \text{ នៃ } Z \text{៖}$$

$$\cos \theta = \frac{x}{r} = \frac{-1}{\sqrt{2}} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\sin \theta = \frac{y}{r} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\theta = \pi - \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{4}$$

$$\text{ដូចនេះ } z_1 + z_2 = \sqrt{2} \left(\cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4} \right) \text{ ។}$$

V. (១៥ពិន្ទុ)

១. បង្ហាញថា $u(x) = xe^{-x}$ ជាចម្លើយ (E) : $y' + y = e^{-x}$
 $u'(x) = (x)'e^{-x} + x(e^{-x})'$

$$= 1e^{-x} + x(-e^{-x}) = e^{-x} - xe^{-x}$$

$$\text{គេបាន } u'(x) + u(x) = (e^{-x} - xe^{-x}) + xe^{-x}$$

$$= e^{-x} \quad (\text{ពិតព្រោះស្មើនឹងអង្គខាងស្តាំ})$$

ដូចនេះ អនុគមន៍ $u(x) = xe^{-x}$ ជាចម្លើយរបស់សមីការ (E) ។

២. ដោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល (E') : $y' + y = 0$

គេអាចសរសេរ (E') : $y' = -y$ មានចម្លើយទូទៅ $y = Ke^{-x}$ ។

ដូចនេះ ចម្លើយសមីការ (E') គឺ $y(x) = Ke^{-x}$ ដែល $K \in \mathbb{R}$ ។

៣. បង្ហាញលក្ខខណ្ឌលុះត្រាតែ និងទាញរកចម្លើយរបស់សមីការ (E)

- សម្រាយបញ្ជាក់៖

($\implies$) សន្មតថា v ជាចម្លើយនៃ (E) នាំឱ្យ៖ $v' + v = e^{-x}$ ។

ដោយ u ជាចម្លើយនៃ (E) ដែរ នោះ $u' + u = e^{-x}$ ។

ដកសមីការទាំងពីរអង្គនិងអង្គ យើងបាន៖

$$(v' + v) - (u' + u) = e^{-x} - e^{-x}$$

$$(v' - u') + (v - u) = 0$$

$$(v - u)' + (v - u) = 0$$

សមីការនេះបង្ហាញថា អនុគមន៍ $v - u$ ជាចម្លើយរបស់សមីការ (E') ។

($\impliedby$) សន្មតថា $v - u$ ជាចម្លើយរបស់សមីការ (E') នាំឱ្យ៖

$$(v - u)' + (v - u) = 0$$

$$v' - u' + v - u = 0$$

$$v' + v = u' + u$$

ដោយ u ជាចម្លើយនៃ (E) នាំឱ្យ $u' + u = e^{-x}$

ដូចនេះយើងបាន $v' + v = e^{-x}$ ។

ដូចនេះ អនុគមន៍ v គឺជាចម្លើយមួយនៃសមីការ (E) ។

- ទាញរកចម្លើយរបស់សមីការ (E) ៖

តាមសម្រាយខាងលើ អនុគមន៍ v ជាចម្លើយនៃ (E) លុះត្រាតែ $v - u$ ជាចម្លើយនៃ (E') ។

គេបានចម្លើយរបស់ (E') គឺមានរាង Ke^{-x} នាំឱ្យ

$$v(x) - u(x) = Ke^{-x}$$

$$v(x) = u(x) + Ke^{-x}$$

យើងទាញបានចម្លើយទូទៅរបស់សមីការ (E) គឺ៖

$$v(x) = xe^{-x} + Ke^{-x}$$

$$= (x + K)e^{-x} \quad (\text{ដែល } K \in \mathbb{R})$$

ដូចនេះ ចម្លើយទូទៅ (E) គឺ $y = (x + K)e^{-x}$ ដែល $K \in \mathbb{R}$ ។

VI. (២០ពិន្ទុ) ១.

- រកវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{BC}$ ៖

$$\overrightarrow{AB} = (-1 - 2, \sqrt{3} - 0, 0 - 0)$$

$$= (-3, \sqrt{3}, 0)$$

$$\overrightarrow{AC} = (-1 - 2, -\sqrt{3} - 0, 0 - 0)$$

$$= (-3, -\sqrt{3}, 0)$$

$$\overrightarrow{BC} = (-1 - (-1), -\sqrt{3} - \sqrt{3}, 0 - 0)$$

$$= (0, -2\sqrt{3}, 0)$$

- បង្ហាញថាត្រីកោណ ABC ជាត្រីកោណសម័ង្ស៖

$$AB = \sqrt{(-3)^2 + (\sqrt{3})^2 + 0^2}$$

$$= \sqrt{9 + 3} = \sqrt{12} = 2\sqrt{3}$$

$$AC = \sqrt{(-3)^2 + (-\sqrt{3})^2 + 0^2}$$

$$= \sqrt{9 + 3} = \sqrt{12} = 2\sqrt{3}$$

$$BC = \sqrt{0^2 + (-2\sqrt{3})^2 + 0^2}$$

$$= \sqrt{12} = 2\sqrt{3}$$

ដោយ $AB = AC = BC = 2\sqrt{3}$

ដូចនេះ ABC ជាត្រីកោណសម័ង្ស។

- រកក្រឡាផ្ទៃនៃត្រីកោណ ABC ៖

$$\text{តាមរូបមន្ត } S = \frac{\sqrt{3}}{4}a^2$$

$$S = \frac{\sqrt{3}}{4}(2\sqrt{3})^2$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{4} \times 12$$

$$= 3\sqrt{3} \quad (\text{ឯកតាផ្ទៃ})$$

២.

- បង្ហាញថាសមីការជាអ៊ីពែបូល៖

$$(2x - 3y)^2 = 6(3y^2 - 2xy - 6)$$

$$4x^2 - 12xy + 9y^2 = 18y^2 - 12xy - 36$$

$$4x^2 + 9y^2 - 18y^2 = -36$$

$$4x^2 - 9y^2 = -36$$

$$\frac{4x^2}{-36} - \frac{9y^2}{-36} = 1$$

$$-\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$$

$$\frac{y^2}{4} - \frac{x^2}{9} = 1$$

មានទម្រង់ $\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$ ដែលជាសមីការអ៊ីពែបូលមានអ័ក្សទទឹងឈរ និងមានផ្ចិតស្ថិតនៅគល់តម្រុយ $O(0, 0)$ ។

- កំណត់កំពូល កំណុំ និងអាស៊ីមតូត៖

យើងទាញបាន $a^2 = 4 \implies a = 2$

និង $b^2 = 9 \implies b = 3$ ។

គណនាកំណុំ $c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{4 + 9} = \sqrt{13}$ ។

- កំពូល៖ $V_1(0, a) = V_1(0, 2)$


និង $V_2(0, -a) = V_2(0, -2)$

- កំណុំ៖ $F_1(0, \sqrt{13})$ និង $F_2(0, -\sqrt{13})$

- សមីការអាស៊ីមតូត៖ $y = \pm \frac{a}{b}x$

$$\implies y = \frac{2}{3}x \text{ និង } y = -\frac{2}{3}x$$

សង់ក្រាបអ៊ីពែបូល៖



VII. (៣៩ពិន្ទុ)

- បង្ហាញទម្រង់ $f(x)$ និងគណនាលីមីត

- បង្ហាញថា $f(x) = 2 - x + \ln\left(\frac{x+1}{x-1}\right)$ ៖

យើងមាន $\ln a - \ln b = \ln\left(\frac{a}{b}\right)$ ចំពោះគ្រប់ $a, b > 0$

ចំពោះគ្រប់ $x \in (1, +\infty)$ នាំឱ្យ $x + 1 > 0$ និង $x - 1 > 0$

យើងបាន៖

$$\begin{aligned} f(x) &= \ln(x+1) - \ln(x-1) - x + 2 \\ &= \ln\left(\frac{x+1}{x-1}\right) - x + 2 \\ &= 2 - x + \ln\left(\frac{x+1}{x-1}\right) \quad (\text{ពិត}) \end{aligned}$$

- គណនាលីមីតក្រុង 1 និងក្រុង $+\infty$ ៖

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 1^+} \left[2 - x + \ln\left(\frac{x+1}{x-1}\right) \right] \\ &= 2 - 1 + \ln\left(\frac{2}{0^+}\right) \\ &= 1 + \ln(+\infty) = +\infty \end{aligned}$$

(ដូចនេះ បន្ទាត់ $x = 1$ ជាអាស៊ីមតូតឈរនៃក្រាប C)

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[2 - x + \ln\left(\frac{x+1}{x-1}\right) \right] \\ &= (2 - \infty) + \ln(1) = -\infty + 0 = -\infty \end{aligned}$$

២. គណនាដេរីវេ សិក្សាអថេរភាព និងសង់តារាងអថេរភាព

- បង្ហាញថា $f'(x) = \frac{-(x^2+1)}{(x+1)(x-1)}$ ៖

ដេរីវេនៃ $f(x) = \ln(x+1) - \ln(x-1) - x + 2$ គឺ៖

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{(x+1)'}{x+1} - \frac{(x-1)'}{x-1} - 1 + 0 \\ &= \frac{1}{x+1} - \frac{1}{x-1} - 1 \\ &= \frac{(x-1) - (x+1)}{(x+1)(x-1)} - \frac{(x+1)(x-1)}{(x+1)(x-1)} \\ &= \frac{-2 - (x^2 - 1)}{(x+1)(x-1)} \\ &= \frac{-2 - x^2 + 1}{(x+1)(x-1)} = \frac{-(x^2+1)}{(x+1)(x-1)} \quad (\text{ពិត}) \end{aligned}$$

- សិក្សាអថេរភាព៖

ចំពោះគ្រប់ $x \in (1, +\infty)$ យើងបាន៖

- ភាគយក $-(x^2+1) < 0$ ជានិច្ច
- ភាគបែង $(x+1)(x-1) = x^2 - 1 > 0$ ជានិច្ច

នាំឱ្យ $f'(x) < 0$ ជានិច្ចចំពោះគ្រប់ $x \in (1, +\infty)$

ដូចនេះ f ជាអនុគមន៍ចុះដាច់ខាតលើដែនកំណត់របស់វា។

តារាងអថេរភាព៖

x	1	$+\infty$
$f'(x)$	—	
$f(x)$	$+\infty$	$-\infty$

៣. បង្ហាញថាបន្ទាត់ $d: y = -x + 2$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេត

យើងបាន៖

$$\begin{aligned} &\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - y_d] \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\left(2 - x + \ln\left(\frac{x+1}{x-1}\right) \right) - (-x + 2) \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln\left(\frac{x+1}{x-1}\right) \\ &= \ln(1) = 0 \end{aligned}$$

ដូចនេះបន្ទាត់ $d: y = -x + 2$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប (C)

ខាង $+\infty$ ។

៤.

- សិក្សាទីតាំងធៀបរវាងក្រាប (C) និងបន្ទាត់ (d) ៖

$$f(x) - y_d = \ln\left(\frac{x+1}{x-1}\right)$$

គ្រប់ $x > 1$ យើងមាន $x+1 > x-1 \implies \frac{x+1}{x-1} > 1$ ។

នាំឱ្យ $\ln\left(\frac{x+1}{x-1}\right) > 0$ ជានិច្ច។

ដូចនេះ ក្រាប (C) ស្ថិតនៅខាងលើបន្ទាត់អាស៊ីមតូតទ្រេត (d) ជានិច្ចលើចន្លោះ $(1, +\infty)$ ។

- ចំណុចពិសេសសម្រាប់ជួយសង់ក្រាប៖

$$\begin{aligned} \text{បើ } x = 2 &\implies f(2) = 2 - 2 + \ln\left(\frac{2+1}{2-1}\right) \\ &= \ln 3 \approx 1.1 \text{ ។ ក្រាបកាត់តាមចំណុច } (2, 1.1) \text{ ។} \end{aligned}$$

សង់ក្រាប (C) និង (d) ៖

x	2	0
$y = -x + 2$	0	2

