Chaleur à domicile: une étude veut déterminer le seuil de dangerosité

Des personnes âgées qui vivent en logement seront suivies tout l'été pour documenter l'impact



Des personnes âgées qui vivent en logement seront suivies tout l'été pour documenter l'impact de la chaleur, dans le cadre d'une étude de l'Université de Montréal.

POUR NE RIEN MANQUER

TÉLÉCHARGEZ L’APPLI
Accédez en temps réel aux nouvelles qui vous concernent

INSCRIVEZ-VOUS
L'essentiel de l'actualité livré gratuitement 3 fois par jour

RESTEZ À JOUR
Activez les alertes web selon vos intérêts

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (COLLABORATION SPÉCIALE)

Mardi, 28 juillet 2026 19:00
MISE À JOUR Mardi, 28 juillet 2026 19:00

PARTAGE

Jusqu’où le mercure à l’intérieur d’un logement peut-il monter avant que des risques pour la santé surviennent ? Une équipe de recherche se déplace directement à domicile pour le savoir.

Ces dernières années, les épisodes de chaleur extrême se sont multipliés. Un phénomène qui peut engendrer une augmentation des hospitalisations et de la mortalité. Pour prévenir ces risques, les instances de santé publique recommandent alors de limiter les efforts physiques trop intenses, de boire beaucoup d’eau, de fréquenter des lieux climatisés et de fermer les rideaux le jour.

Mais à partir de quand la température à l’intérieur d’un logement devient-elle réellement problématique pour la

santé ?

Traditionnellement, les effets de la chaleur sur le corps humain sont étudiés en laboratoire, dans une chambre climatique permettant de contrôler la température. Mais voilà qu'un projet de recherche lancé cet été mesure les conséquences de la chaleur en conditions réelles, soit directement dans les logements des participants.

L'objectif principal est d'établir un seuil critique de température intérieure. Autrement dit, de déterminer à partir de quel moment la chaleur entraîne une hausse dangereuse de certains indicateurs, qu'ils soient physiologiques (comme la fréquence cardiaque) ou perceptuels (tel le sentiment d'inconfort).

« Ce point de bascule thermique fait actuellement débat. Certains experts avancent 26 °C, d'autres 28 °C. L'étude vise à fournir des données concrètes pour trancher et, à terme, guider des normes ou des réglementations, notamment pour les milieux vulnérables comme les logements sociaux, les CHSLD ou même les écoles », explique Daniel Gagnon, chercheur derrière l'étude et professeur à l'École de kinésiologie et des sciences de l'activité physique de l'Université de Montréal.



La science s'invite à la maison

Des participants âgés en moyenne de 70 ans (une population plus vulnérable aux contrecoups de la chaleur) qui vivent dans des logements sociaux de Montréal sont suivis pendant tout l'été, sur une période de quatre mois, pour observer les effets cumulatifs de la chaleur, et pas seulement ceux liés à des vagues de chaleur.

Pour recueillir leurs données, Daniel Gagnon et Luc Souilla, chercheur postdoctoral, ont installé un ensemble d'outils directement chez les participants. Un capteur

environnemental enregistre en continu la température, le taux d'humidité et même la qualité de l'air. Ces données permettent de comprendre l'effet de la chaleur et son interaction avec la pollution.

Les participants portent également une montre connectée qui enregistre des données sur leur activité (leur nombre de pas et la qualité de leur sommeil) et permet de répondre à de courtes questions trois fois par jour : ont-ils chaud ? Se sentent-ils fatigués ? Transpirent-ils ? Ces informations permettent de capter le ressenti du participant – un aspect souvent négligé, indique Luc Souilla.



À cela s'ajoutent des mesures physiologiques comme la pression artérielle, la température corporelle et la variation du poids (pour surveiller la déshydratation). Toutes ces données sont centralisées et transmises aux chercheurs grâce à un dispositif innovant.

Des risques à surveiller pour mieux prévenir

L'étude se concentre sur trois grands types de stress liés à la chaleur : d'abord, la déshydratation, causée par une perte excessive d'eau due à la transpiration ; ensuite, la surcharge cardiovasculaire, lorsque le cœur doit travailler davantage pour réguler la température corporelle ; enfin, l'astreinte thermique elle-même, qui correspond à une élévation dangereuse de la température interne du corps.

Les chercheurs s'intéressent aussi à des conséquences plus subtiles qui influencent la qualité de vie, notamment la fatigue, l'irritabilité, la perte de motivation et la diminution des activités quotidiennes.

« On sait déjà que les vagues de chaleur sont associées à une hausse des hospitalisations et des décès. Mais ces

événements représentent seulement la partie visible du problème. Avec cette étude, nous souhaitons comprendre ce qui se passe avant d'en arriver là, les premiers signes de détérioration, souvent invisibles, mais qui s'accumulent au fil des jours », précise Daniel Gagnon.

INFOLETTRE



UN SURVOL INTELLIGENT POUR RESTER À JOUR, MÊME LE MIDI

En semaine

exemple@courriel.com

Je m'inscris

Voir toutes nos infolettres

Voir la politique de confidentialité

0 Commentaires

Vous devez être connecté pour commenter. **Se connecter**

© 2026 Le Journal de Montréal Inc. Tous droits réservés.