

①

Q-1 Find the value of  $y(0.2)$  and  $y'(0.2)$

where  $y'' = n \cdot (y')^2 - y^2$  given that

$y=1$ ,  $\frac{dy}{dx} = 0$  at  $x=0$  by using R-K method.

Soln Given that

$$\frac{d^2y}{dx^2} = n \cdot \left(\frac{dy}{dx}\right)^2 - y^2, \quad y(0)=1, \quad \left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=0} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx}\right) = n \cdot \left(\frac{dy}{dx}\right)^2 - y^2, \quad y(0)=1, \quad \left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=0} = 0$$

putting  $\frac{dy}{dx} = z$

$$\therefore \frac{dz}{dx} = n z^2 - y^2, \quad y(0)=1, \quad z(0)=0$$

$$\left. \begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= f(x, y, z) = z, \quad y(0)=1 \\ \frac{dz}{dx} &= g(x, y, z) = n z^2 - y^2, \quad z(0)=0 \end{aligned} \right\}$$




(2)

09

Here  $x_0 = 0$ ,  $y_0 = 1$ ,  $z_0 = 0$ .

10



11

12

$$h = 0.2$$

13

14

We have to find  $y(0.2)$  and  $y'(0.2)$ 

15

i.e.  $y(0.2)$  and  $z(0.2)$ 

16

 $\Rightarrow y(x_1)$  and  $z(x_1)$ 

17

i.e.  $y_1$  and  $z_1$ 

18

We know by R-K method

19

09

SUNDAY • 252-113

$$y_1 = y_0 + \frac{1}{6} [k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4]$$

$$z_1 = z_0 + \frac{1}{6} [m_1 + 2m_2 + 2m_3 + m_4]$$



we have to determine  $k_1, k_2, k_3, k_4$  and  $m_1, m_2, m_3, m_4$ .

$$k_1 = h f(x_0, y_0, z_0)$$

$$= 0.2 \cdot f(0, 1, 0)$$

$$= (0.2) \cdot 0$$

$$k_1 = 0$$

$$m_1 = h g(x_0, y_0, z_0)$$

$$= 0.2 g(0, 1, 0)$$

$$= 0.2 [0.0 - (1)^2] = -0.2$$

$$m_1 = -0.2$$

$$k_2 = h f(x_0 + \frac{h}{2}, y_0 + \frac{k_1}{2}, z_0 + \frac{m_1}{2})$$

$$= 0.2 f(0.1, 1, -0.1)$$

$$= (0.2) \cdot (-0.1) = -0.02$$

$$k_2 = -0.02$$

$$m_2 = h g(x_0 + \frac{h}{2}, y_0 + \frac{k_1}{2}, z_0 + \frac{m_1}{2})$$

$$= h g(0.1, 1, -0.1)$$

$$= (0.2) [(0.1) - (0.1)^2 - (1)^2]$$

$$= (0.2) [(0.1)(0.01) - 1]$$

$$m_2 = -0.1998$$

$$k_3 = h f(x_0 + \frac{h}{2}, y_0 + \frac{k_2}{2}, z_0 + \frac{m_2}{2})$$

$$= 0.2 f(0.1, 0.99, -0.0999)$$

$$= (0.2) \cdot (-0.0999)$$

$$k_3 = -0.01998$$

$$m_3 = h g(x_0 + \frac{h}{2}, y_0 + \frac{k_2}{2}, z_0 + \frac{m_2}{2})$$

$$= 0.2 g(0.1, 0.99, -0.0999)$$

$$= (0.2) [(0.1) \cdot (-0.0999)^2 - (0.99)^2]$$

$$m_3 = -0.1958$$



11

TUESDAY  
254-111  
Week 37

SEPTEMBER 2018

(4)

$$k_4 = h f(x_0 + h, y_0 + k_3, z_0 + m_3)$$

10

$$= 0.2 f(0.2, 1 - 0.01998, -0.1958)$$

11

12

$$= 0.2 (-0.1958)$$

13

$$k_4 = -0.03916$$

14

15

$$m_4 = h g(x_0 + h, y_0 + k_3, z_0 + m_3)$$

$$= h g(0.2, 0.98002, -0.1958)$$

$$= 0.2 [(0.2) (-0.1958)^2 - (0.98002)]$$

$$= -0.19055$$

$$m_4 = -0.19055$$

Now

16

17

$$y_1 = y_0 + \frac{1}{6} [k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4]$$

18

$$= 1 + \frac{1}{6} [0 + 2(-0.02) + 2(-0.01998) + (-0.03916)]$$

19

$$y_1 = 0.9801$$

$$\Rightarrow y(0.2) = 0.9801$$



(5)

$$z_1 = z_0 + \frac{1}{6} [m_1 + 2m_2 + 2m_3 + m_4]$$

$$= 0 + \frac{1}{6} [-0.2 + 2(-0.1998) + 2(-0.1958) + (-0.19055)]$$

$$z_1 = -0.1967$$

$$\therefore z(0.2) = -0.1967$$

$$\therefore y'(0.2) = -0.1967$$

Q.1 H.W

Using R-K method order 4, solve the system of diff-eqn.

$$\frac{dy}{dx} = 1 + xz, \quad \frac{dz}{dx} = x - xy$$

find the value of  $y(0.3)$  and  $z(0.3)$

where  $x=0, y=0, z=1$ .

Q.2 Using R-K method

Solve  $y'' = y + xy'$ ,  $y(0) = 1$ ,  $y'(0) = 0$

find  $y(0.2)$  and  $y'(0.2)$

10 / 2018	01 02 03 04 05 06 07	08 09 10 11 12 13 14	15 16 17 18 19 20 21	22 23 24 25 26 27 28	29 30 31
OCTOBER / Week	40	41	42	43	44



(6)

Using Euler method,

Solve  $\frac{dy}{dx} = -\frac{1}{2}y$ ,  $\frac{dz}{dx} = 4 - 0.3z - 0.1y$

$y(0) = 4$ ,  $z(0) = 6$ ,  $h = 0.5$

Find the value of  $y(0.5)$  and  $z(0.5)$   
and also  $y(1)$  and  $z(1)$ .

~~Solve~~  ~~$y'' + 0.3y' + 0.1y = 4$~~

Solve

$$y'' + 0.3y' + 0.1y = 4$$

by using Euler method

Find the value of  $y(0.5)$ ,  $z(0.5)$   
 $y(1)$  and  $z(1)$  where

$y(0) = 4$ ,  $z(0) = 6$ ,  $h = 0.5$ .




(7)

Soln Given that

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{y}{2} = f(x, y, z), \quad y(0) = 4$$

$$\frac{dz}{dx} = g(x, y, z) = 4 - 0.5x - 0.1y$$

$$z(0) = 6$$



Let  $x_0 = 0, y_0 = 4, z_0 = 6$ .

W.K.T Euler method

$$y_{n+1} = y_n + h f(x_n, y_n, z_n)$$

putting  $n = 0$

$$y_1 = y_0 + h f(x_0, y_0, z_0)$$

$$= 4 + (0.5) \cdot \left(-\frac{y_0}{2}\right)$$

$$= 4 + (0.5) \cdot \left(\frac{4}{2}\right) = 3$$

$$\boxed{y_1 = 3}$$



is  $y(x) = 3$  i.e.  $y(0.5) = 3$

now  $z_{n+1} = z_n + h g(x_n, y_n, z_n)$

for  $n=0$  we get

$$z_1 = z_0 + h g(x_0, y_0, z_0)$$

$$= 6 + (0.5) \cdot [4 - 0.3z_0 - 0.1y_0]$$

$$= 6 + (0.5) [4 - (0.3) \cdot 6 - (0.1) \cdot (4)]$$

$$= 6 + 0.9 = 6.9$$

$\therefore z_1 = 6.9$

i.e.  $z(x) = 6.9$

$\Rightarrow z(0.5) = 6.9$

Now  $x_1 = 0.5, y_1 = 3, z_1 = 6.9$

We have to find  $y_2$  and  $z_2$   
i.e.  $y(1)$  and  $z(1)$ .



(9)

Taking  $n=1$  in Euler's method

$$y_2 = y_1 + h f(x_1, y_1, z_1)$$

$$= 3 + (0.5) \left( -\frac{y_1}{2} \right)$$

$$= 3 + (0.5) \left( -\frac{3}{2} \right) = 2.25$$

$$\therefore \boxed{y_2 = 2.25} \Rightarrow \boxed{y(1) = 2.25}$$

Similarly

$$z_2 = z_1 + h g(x_1, y_1, z_1)$$

$$= 6.9 + 0.5 [4 - 0.3 z_1 - 0.1 y_1]$$

$$= 6.9 + 0.5 [4 - 0.3(6.9) - 0.1(3)]$$

$$\boxed{z_2 = 7.715}$$

$$\therefore \boxed{z(1) = 7.715}$$



H.W

09

Q Using Euler method

10

Solve  $y'' + 2y' + \frac{3}{4}y = 0$ 

11

$$y(0) = 3, y'(0) = -2.5$$

12

$$\text{where } h = 0.2$$

13

find ①  $y(0.2)$  and  $y'(0.2)$ .

14

15

②  $y(0.4)$  and  $y'(0.4)$