

# Algorithmen und Datenstrukturen

## Sommersemester 2022

### Blatt 1

Kevin Angele, Tobias Dick, Oskar Neuhuber,  
Andrea Portscher, Monika Steidl, Laurin Wischounig

Abgabe bis 15.3.2022 23:59  
Besprechung im PS am 17.03.2022

### Aufgabe 1 (3 Punkte): Asymptotisches Wachstum

Ordnen Sie die nachfolgenden Funktionen anhand ihres asymptotischen Wachstums. Begründen Sie Ihre Antwort.

$$4n \log n + 2n, 2^{10}, 2^{\log_2 n}, 3n + 100 \log n, 4n, 2^n, n^2 + 10n, n^3, n \log n$$

**Lösung:**

$$2^{10}, 2^{\log_2 n}, 3n + 100 \log n, 4n, n \log n, 4n \log n + 2n, n^2 + 10n, n^3, 2^n$$

### Aufgabe 2 (4 Punkte): Komplexität

- (a) Beweisen Sie für die Funktion  $f(n) = 5n^2 + 3n \log_2 n + 2n + 5$ , dass  $f(n) \in \mathcal{O}(n^2)$ .
- (b) Beweisen Sie für die Funktion  $g(n) = 20n^3 + 10n \log_2 n + 5$ , dass  $g(n) \in \mathcal{O}(n^3)$ .
- (c) Beweisen Sie für die Funktion  $h(n) = 3 \log_2 n + 2$ , dass  $h(n) \in \mathcal{O}(\log n)$ .
- (d) Beweisen Sie für die Funktion  $k(n) = 2^{n+2}$ , dass  $k(n) \in \mathcal{O}(2^n)$ .
- (e) Beweisen Sie für die Funktion  $l(n) = 2n + 100 \log_2 n$ , dass  $l(n) \in \mathcal{O}(n)$ .

**Lösung:**

- (a)  $5n^2 + 3n \log_2 n + 2n + 5 \leq (5 + 3 + 2 + 5)n^2 = cn^2$  for  $c = 15$ , when  $n \geq n_0 = 1$
- (b)  $20n^3 + 10n \log_2 n + 5 \leq 35n^3$  for  $n \geq 1$
- (c)  $3 \log_2 n + 2 \leq 5 \log_2 n$  for  $n \geq 2$
- (d)  $2^{n+2} = 2^n \times 2^2$ , we take  $c = 4$  and  $n_0 = 1$
- (e)  $2n + 100 \log_2 n \leq 102n$ , we take  $c = 102$  and  $n_0 = 1$ , when  $n \geq n_0 = 1$

### Aufgabe 3 (3 Punkte): Komplexität von Polynomfunktionen

Sei  $p(n)$  eine Polynomfunktion von Grad  $d$  mit positiven Koeffizienten  $a_i > 0$ :

$$p(n) = \sum_{i=0}^d a_i n^i$$

Beweisen Sie für jede Konstante  $k \geq d$  und  $n \geq n_0 = 1$ , dass  $p(n) \in O(n^k)$ .

**Lösung:**

$$\begin{aligned} p(n) &= \sum_{i=0}^d a_i n^i \\ \Rightarrow p(n) &= a_0 n^0 + a_1 n^1 + a_2 n^2 + \dots + a_d n^d \\ \Rightarrow p(n) &\leq a_0 n^k + a_1 n^k + a_2 n^k + \dots + a_d n^k \text{ where } k \geq d \\ \Rightarrow p(n) &\leq (a_0 + a_1 + a_2 + \dots + a_d) n^k \\ \Rightarrow p(n) &\leq c \cdot n^k \text{ where } c = a_0 + a_1 + a_2 + \dots + a_d > 0 \\ \Rightarrow p(n) &\in O(n^k) \end{aligned}$$