



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ  
INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E NATURAIS  
FACULDADE DE COMPUTAÇÃO  
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO**

**PEDRO PAULO LISBOA DE SOUSA**

**PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA  
RESOLUÇÃO DAS QUESTÕES DA LISTA DE VARIÁVEIS ALEATÓRIAS**

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ**  
**INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E NATURAIS**  
**FACULDADE DE COMPUTAÇÃO**  
**SISTEMAS DE INFORMAÇÃO**  
**ESTUDANTE: Pedro Paulo Lisboa de Sousa/ 201711140038**  
**TURMA: 2017**  
**DATA: 04 de Dezembro de 2018**

**RESOLUÇÃO DAS QUESTÕES DA LISTA  
DE VARIÁVEIS ALEATÓRIAS**

Resolução das questões da lista referentes à disciplina de Probabilidade e Estatística, do curso de Bacharelado em Sistemas de Informação, como complemento à 2ª avaliação.

Professor: Miguel Monteiro de Souza

# Sumário

Variável Aleatória Discreta . . . . .	1
Modelos de Probabilidade Discretos . . . . .	4
Variável Aleatória Contínua . . . . .	5
Modelos de Probabilidade Contínuos . . . . .	6
Referências Bibliográficas . . . . .	7

## Variável Aleatória Discreta

1. Em um determinado condomínio residencial 30% das famílias não tem filhos, 40% tem 1 filho, 20% tem 2 filhos e 10% tem 3 filhos. Seja  $X$  o número de filhos de uma família sorteada ao acaso dentro desse condomínio residencial.

30% não tem filhos

40% tem 1 filho

20% tem 2 filhos

10% tem 3 filhos

- a) Determine a função de probabilidade e a distribuição acumulada de  $X$ .

$x$ : nº de filhos

$\{0,1,2,3\} \rightarrow$  possíveis valores que  $x$  pode assumir.

$p(0) = 0,3$ ;  $p(1) = 0,4$ ;  $p(2) = 0,2$ ;  $p(3) = 0,1$

$X$	0	1	2	3
$P(x_i)$	0,3	0,4	0,2	0,1

*OBS: Falta o gráfico*

- b) Calcule a esperança e o desvio padrão de  $X$ .

$$E(X) = \sum_{i=1}^n x_i p(x_i); \text{Var}(x) = \sum_{i=1}^n x_i^2 p(x_i) - [E(X)]^2; DP = \sqrt{\text{Var}(X)}$$

$X$	$p(x_i)$	$x_i \cdot p(x_i)$
0	0,3	0
1	0,4	0,4
2	0,2	0,4
3	0,1	0,3
Total		1,1

$X$	$p(x_i)$	$x_i^2 \cdot p(x_i)$
0	0,3	0
1	0,4	0,4
2	0,2	0,8
3	0,1	0,9
Total		2,1

$E(X) = 1,1$ ;

$\text{Var}(X) = 2,1 - (1,1)^2 \rightarrow 2,1 - 1,21 = 0,89$

$DP = \sqrt{0,89} \rightarrow 0,9434$

2. Um indivíduo que possui um seguro de automóvel de uma determinada empresa é selecionado aleatoriamente. Seja  $Y$  o número de infrações ao código de trânsito para as quais o indivíduo foi reincidente nos últimos 3 anos. A função de probabilidade de  $Y$  é:

$Y$	0	1	2	3
$P(Y=y)$	0,60	0,25	0,10	0,05

- a) Calcule  $E(Y)$ .

$$E(Y) = \sum_{i=1}^n y_i p(y_i)$$

$Y$	$p(y_i)$	$y_i \cdot p(y_i)$
0	0,6	0
1	0,25	0,25
2	0,1	0,2
3	0,05	0,15
Total		0,6

Logo,  $E(Y) = 0,6$ .

- b) Suponha que um indivíduo com  $Y$  infrações reincidentes incorra em uma multa de  $U\$100Y^2$ . Calcule o valor esperado da multa.

$$v = 100Y^2 \rightarrow E(v) = E(100Y^2) \rightarrow E(v) = 100 \cdot E(Y^2)$$

$$E(Y^2) = \sum_{i=1}^n y_i^2 \cdot p(y_i)$$

Y	$p(y_i)$	$y_i \cdot p(y_i)$
0	0,6	0
1	0,25	0,25
2	0,1	0,4
3	0,05	0,45
Total		1,1

Logo,  $E(Y^2) = 1,1$ .

Com isso,  $E(v) = 100 \cdot E(Y^2) \rightarrow 100 \cdot 1,1 \rightarrow 110$ .

Valor esperado: US\$110.

5. Um dado é lançado duas vezes. Seja  $X$  a soma dos resultados. Calcule  $E(X)$ .

$$\Omega = \left\{ \begin{matrix} (1,1), & (1,2), & (1,3), & (1,4), & (1,5), & (1,6) \\ (2,1), & (2,2), & (2,3), & (2,4), & (2,5), & (2,6) \\ (3,1), & (3,2), & (3,3), & (3,4), & (3,5), & (3,6) \\ (4,1), & (4,2), & (4,3), & (4,4), & (4,5), & (4,6) \\ (5,1), & (5,2), & (5,3), & (5,4), & (5,5), & (5,6) \\ (6,1), & (6,2), & (6,3), & (6,4), & (6,5), & (6,6) \end{matrix} \right\} \quad X = \left\{ \begin{matrix} 2, & 3, & 4, & 5, & 6, & 7 \\ 3, & 4, & 5, & 6, & 7, & 8 \\ 4, & 5, & 6, & 7, & 8, & 9 \\ 5, & 6, & 7, & 8, & 9, & 10 \\ 6, & 7, & 8, & 9, & 10, & 11 \\ 7, & 8, & 9, & 10, & 11, & 12 \end{matrix} \right\}$$

X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$p(x_i)$	$1/36$	$2/36$	$3/36$	$4/36$	$5/36$	$6/36$	$5/36$	$4/36$	$3/36$	$2/36$	$1/36$
$x_i \cdot p(x_i)$	$2/36$	$6/36$	$12/36$	$20/36$	$30/36$	$42/36$	$40/36$	$36/36$	$30/36$	$22/36$	$12/36$

$$E(X) = \sum_{i=1}^n x_i \cdot p(x_i)$$

$$E(X) = \frac{2}{36} + \frac{6}{36} + \frac{12}{36} + \dots + \frac{12}{36} = \frac{252}{36} = 7$$

6. Um homem possui 4 chaves em seu bolso. Como está escuro, ele não consegue ver qual a chave correta para abrir a porta de sua casa. Ele testa cada uma das chaves até encontrar a correta.

$C$  - chave da porta.

$E_1, E_2$  e  $E_3$  - outras chaves.

- a) Defina um espaço amostral para esse experimento.

$$\Omega = \left\{ \begin{matrix} C, & E_1C, & E_2C, & E_3C, & E_1E_2C, & E_2E_1C, & E_1E_3C, & E_3E_1C \\ E_2E_3C, & E_3E_2C, & E_1E_2E_3C, & E_1E_3E_2C, & E_2E_1E_3C, & E_2E_3E_1C, & E_3E_1E_2C, & E_3E_2E_1C \end{matrix} \right\}$$

- b) Defina a v.a.  $X$  = número de chaves experimentadas até conseguir abrir a porta (inclusive a chave correta). Quais são os valores de  $X$ ? Qual é a função de probabilidade de  $X$ ?

$\Omega$ (em n° de tentativas) =  $\{1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4\}$

A partir de  $\Omega$ , podemos ver que  $X = \{1, 2, 3, 4\}$ .

$$p(1) = \frac{1}{4}$$

$$p(2) = p(E_1C \cup E_2C \cup E_3C) \rightarrow \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{3} \rightarrow 3 \cdot \frac{1}{12} \rightarrow \frac{1}{4}$$

$$p(3) = p(E_1E_2C \cup E_2E_1C \cup E_1E_3C \cup E_3E_1C \cup E_2E_3C \cup E_3E_2C) \rightarrow 6 \cdot \left( \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \right) \rightarrow \frac{6}{12} \rightarrow \frac{1}{4}$$

$$p(4) = p(E_1E_2E_3C \cup E_1E_3E_2C \cup E_2E_1E_3C \cup E_2E_3E_1C \cup E_3E_1E_2C \cup E_3E_2E_1C) \rightarrow 6 \cdot \left( \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1} \right) \rightarrow \frac{6}{12} \rightarrow \frac{1}{4}$$

X	$p(x_i)$
1	$1/4$
2	$1/4$
3	$1/4$
4	$1/4$

7. Seja uma v.a.  $X$  com fdp dada na tabela a seguir:

$X$	0	1	2	3	4	5
$P(X = x)$	0	$p^2$	$p^2$	$p$	$p$	$p^2$

a) Encontre o valor de  $p$ .

Como  $\sum_{i=1}^n p(x_i) = 1$ , temos:  $3p^2 + 2p = 1 \rightarrow 3p^2 + 2p - 1 = 0$ .

Resolvendo a equação chegamos as raízes  $-1$  e  $\frac{1}{3}$ . Como a  $p$  é a probabilidade de um evento ocorrer, temos  $p \geq 0$ . Logo,  $p = \frac{1}{3}$ .

b) Calcule  $P(X \geq 4)$  e  $P(X < 3)$ .

$$P(X \geq 4) \rightarrow p^2 + p \rightarrow \left(\frac{1}{3}\right)^2 + \frac{1}{3} \rightarrow \frac{1}{9} + \frac{1}{3} \rightarrow \frac{1+3}{9} \rightarrow \frac{4}{9}$$

$$P(X < 3) \rightarrow 2p^2 \rightarrow 2 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^2 \rightarrow \frac{2}{9}$$

c) Calcule  $P(|X - 3| \geq 2)$ .

$$|x - 3| \geq 2 \begin{cases} x - 3 \geq 2 & \rightarrow x \geq 5 \\ x - 3 \leq -2 & \rightarrow x \leq 1 \end{cases}$$

$$P(|x - 3| \geq 2) = P(X \leq 1) + P(X \geq 5) \rightarrow p^2 + p^2 \rightarrow 2 \cdot p^2 \rightarrow 2 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^2 \rightarrow \frac{2}{9}$$

## Modelos de Probabilidade Discretos

1. Um atirador acerta na mosca do alvo, 20% dos tiros. Qual a probabilidade de ele acertar na mosca pela primeira vez no 10º tiro?

$$p = 0,2; x = 10$$

$$P(X = 10) = 0,2^1 \cdot 0,8^{10-1} \rightarrow (0,2) \cdot (0,8)^9 \rightarrow (0,2) \cdot (0,8)^9 \rightarrow 0,0268$$

2. Joga-se um dado equilibrado. Qual é a probabilidade de serem necessários 10 lançamentos até a primeira ocorrência de um seis?

$$p = \frac{1}{6}; x = 10$$

$$P(X = 10) = \frac{1}{6} \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^9 \rightarrow 0,0323$$

3. Joga-se um dado equilibrado. Qual é a probabilidade de serem necessários 10 lançamentos até a terceira ocorrência de um seis?

$$p = \frac{1}{6}; x = 10; k = 3$$

$$\binom{10-1}{3-1} \cdot \left(\frac{1}{6}\right)^3 \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^7 \rightarrow \frac{9!}{2! \cdot 7!} \cdot \left(\frac{1}{6}\right)^3 \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^7 \rightarrow \frac{9 \cdot 8}{2 \cdot 6 \cdot 36} \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^7 \rightarrow \frac{1}{6} \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^7 \rightarrow 0,0465$$

4. Um atirador acerta na mosca do alvo, 20% dos tiros. Se ele dá 10 tiros, qual a probabilidade de ele acertar na mosca no máximo 1 vez?

$$p = 0,2$$

$$P(X \leq 1) = P(0) + P(1)$$

$$P(0) = \binom{10}{0} \cdot (0,2)^0 \cdot (0,8)^{10} \rightarrow \frac{10!}{0! \cdot 10!} \cdot (0,2)^0 \cdot (0,8)^{10} \rightarrow 0,1074$$

$$P(1) = \binom{9}{1} \cdot (0,2)^1 \cdot (0,8)^9 \rightarrow \frac{10!}{1! \cdot 9!} \cdot (0,2)^1 \cdot (0,8)^9 \rightarrow 10 \cdot (0,2) \cdot (0,8)^9 \rightarrow 0,2684$$

$$P(X \leq 1) = 0,1074 + 0,2684 \rightarrow 0,3758$$

5. Entre os 16 programadores de uma empresa, 12 são do sexo masculino. A empresa decide sortear 5 programadores para fazer um curso avançado de programação. Qual é a probabilidade dos 5 sorteados serem do sexo masculino?

$$P(X = 5) = \frac{\binom{12}{5}}{\binom{16}{5}}$$

6. Uma central telefônica recebe uma média de 5 chamadas por minuto. Supondo que as chamadas que chegam constituam uma distribuição de Poisson, qual é a probabilidade de a central não receber nenhuma chamada em um minuto? e de receber no máximo 2 chamadas em 2 minutos?

7. Seja  $X$  uma v.a. aleatória binomial  $(n, p)$  com  $n = 5$ ,  $p = \frac{1}{3}$ . Calcule  $E(X^2)$ .

8. Em um certo tipo de fabricação de fita magnética, ocorrem cortes a uma taxa de um corte por 2000 pés. Qual é a probabilidade de que um rolo com comprimento de 4000 pés apresente no máximo dois cortes? Pelo menos dois cortes?

10. A probabilidade de uma máquina produzir uma peça defeituosa em um dia é 0,1.

a) Qual a probabilidade de que, em 20 peças produzidas em um dia, exatamente 5 sejam defeituosas?

b) Qual a probabilidade de que a 10ª peça produzida em um dia seja a primeira defeituosa?

11. Certo curso de treinamento aumenta a produtividade de uma certa população de funcionários em 80% dos casos. Se 10 funcionários quaisquer participam deste curso, encontre a probabilidade de:

- a) exatamente 7 funcionários aumentarem a produtividade;
- b) pelo menos 3 funcionários não aumentarem a produtividade;
- c) não mais que 8 funcionários aumentarem a produtividade.



## Variável Aleatória Contínua

1. Seja  $X$  uma v.a. contínua cuja densidade de probabilidade é dada por:

$$f(x) = kx^2 \text{ se } 0 \leq x \leq 1.$$

- a) Determine o valor de  $k$ .
- b) Calcule  $P(\frac{1}{4} < X < \frac{1}{2})$ .
- c) Calcule  $E(X)$  e  $Var(X)$ .

2. O tempo de vida útil, em anos, de um eletrodoméstico é uma variável aleatória com densidade dada por

$$f(x) = \frac{xe^{-x}}{4}, \quad x > 0.$$

- a) Mostre que  $f(x)$  integra 1.
  - b) Se o fabricante dá um tempo de garantia de seis meses para o produto, qual a proporção de aparelhos que devem usar essa garantia?
4. A percentagem de álcool ( $100X$ ) em certo composto pode ser considerada uma variável aleatória com a seguinte fdp:

$$f(x) = 20x^3(1-x), \quad 0 < x < 1.$$

- a) Estabeleça a  $FD$  de  $X$ .
- b) Calcule  $P(X < \frac{2}{3})$ .
- c) Suponha que o preço de venda desse composto dependa do conteúdo de álcool. Especificamente, se  $\frac{1}{3} < X < \frac{2}{3}$ , o composto se vende por  $C_1$  dólares/galão, caso contrário ele se vende por  $C_2$  dólares/galão. Se o custo  $C_3$  dólares/galão, calcule a distribuição de probabilidade do lucro líquido por galão.

## Modelos de Probabilidade Contínuos

1. Dada a v.a.  $X$ , uniforme em  $[5, 10]$ , calcule as probabilidades abaixo:
  - a)  $P(X < 7)$ .
  - b)  $P(8 < X < 9)$ .
  - c)  $P(X > 8,5)$ .
  - d)  $P(|X - 7,5| > 2)$ .
3. Suponha que a duração de uma componente eletrônica possui distribuição exponencial com parâmetro  $\lambda = 1$ , calcule:
  - a) A probabilidade de que a duração seja menor a 10.
  - b) A probabilidade de que a duração esteja entre 5 e 15.
  - c) O valor  $t$  tal que a probabilidade de que a duração seja maior a  $t$  assuma o valor 0.01.
4. As alturas de 10:000 alunos de um colégio têm distribuição aproximadamente normal, com média  $170\text{cm}$  e desvio padrão  $5\text{cm}$ . Qual o número esperado de alunos com altura superior a  $165\text{cm}$ ?
11. O saldo médio dos clientes de um banco é uma v.a. normal com média  $R\$2.000,00$  e desvio padrão  $R\$250,00$ . Os clientes com os 10% maiores saldos médios recebem tratamento VIP, enquanto aqueles com os 5% menores saldos médios receberão propaganda extra para estimular maior movimentação da conta.
  - a) Quanto você precisa de saldo médio para se tornar um cliente VIP?
  - b) Abaixo de qual saldo médio o cliente receberá a propaganda extra?



# Referências Bibliográficas

- [1] MEYER, P.L. *Probabilidade: Aplicações à Estatística*. 2 ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1983.
- [2] BUSSAB, W.; Morettin, P. *Estatística básica*. 5.ed. São Paulo: Saraiva, 2006. ISBN 9788502034979.