



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E NATURAIS
FACULDADE DE COMPUTAÇÃO
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO**

PEDRO PAULO LISBOA DE SOUSA

**PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA
RESOLUÇÃO DAS QUESTÕES DA LISTA DE VARIÁVEIS ALEATÓRIAS**

Belém/PA
2018

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E NATURAIS
FACULDADE DE COMPUTAÇÃO
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
ESTUDANTE: Pedro Paulo Lisboa de Sousa/ 201711140038
TURMA: 2017
DATA: 04 de Dezembro de 2018

**RESOLUÇÃO DAS QUESTÕES DA LISTA
DE VARIÁVEIS ALEATÓRIAS**

Resolução das questões da lista referentes à disciplina de Probabilidade e Estatística, do curso de Bacharelado em Sistemas de Informação, como complemento à 2ª avaliação.

Professor: Miguel Monteiro de Souza

Sumário

| | |
|--|---|
| Variável Aleatória Discreta | 1 |
| Modelos de Probabilidade Discretos | 3 |
| Variável Aleatória Contínua | 4 |
| Modelos de Probabilidade Contínuos | 5 |
| Referências Bibliográficas | 7 |

Variável Aleatória Discreta

1. Em um determinado condomínio residencial 30% das famílias não tem filhos, 40% tem 1 filho, 20% tem 2 filhos e 10% tem 3 filhos. Seja X o número de filhos de uma família sorteada ao acaso dentro desse condomínio residencial.

30% não tem filhos

40% tem 1 filho

20% tem 2 filhos

10% tem 3 filhos

- a) Determine a função de probabilidade e a distribuição acumulada de X .

x : nº de filhos

$\{0,1,2,3\} \rightarrow$ possíveis valores que x pode assumir.

$p(0) = 0,3$; $p(1) = 0,4$; $p(2) = 0,2$; $p(3) = 0,1$

| | | | | |
|----------|-----|-----|-----|-----|
| X | 0 | 1 | 2 | 3 |
| $P(x_i)$ | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,1 |

OBS: Falta o gráfico

- b) Calcule a esperança e o desvio padrão de X .

$$E(x) = \sum_{i=1}^n x_i p(x_i); \text{Var}(x) = \sum_{i=1}^n x_i^2 p(x_i) - [E(x)]^2; DP = \sqrt{\text{Var}(x)}$$

| x | $p(x)$ | $x \cdot p(x)$ |
|-------|--------|----------------|
| 0 | 0,3 | 0 |
| 1 | 0,4 | 0,4 |
| 2 | 0,2 | 0,4 |
| 3 | 0,1 | 0,3 |
| Total | | 1,1 |

| x | $p(x)$ | $x^2 \cdot p(x)$ |
|-------|--------|------------------|
| 0 | 0,3 | 0 |
| 1 | 0,4 | 0,4 |
| 2 | 0,2 | 0,8 |
| 3 | 0,1 | 0,9 |
| Total | | 2,1 |

$E(x) = 1,1$;

$\text{Var}(x) = 2,1 - (1,1)^2 \rightarrow 2,1 - 1,21 = 0,89$

$DP = \sqrt{0,89} \rightarrow 0,9434$

2. Um indivíduo que possui um seguro de automóvel de uma determinada empresa é selecionado aleatoriamente. Seja Y o número de infrações ao código de trânsito para as quais o indivíduo foi reincidente nos últimos 3 anos. A função de probabilidade de Y é:

| | | | | |
|------------|------|------|------|------|
| Y | 0 | 1 | 2 | 3 |
| $P(Y = y)$ | 0,60 | 0,25 | 0,10 | 0,05 |

- a) Calcule $E(Y)$.

- b) Suponha que um indivíduo com Y infrações reincidentes incorra em uma multa de $U\$100Y^2$. Calcule o valor esperado da multa.

5. Um dado é lançado duas vezes. Seja X a soma dos resultados. Calcule $E(X)$.

6. Um homem possui 4 chaves em seu bolso. Como está escuro, ele não consegue ver qual a chave correta para abrir a porta de sua casa. Ele testa cada uma das chaves até encontrar a correta.

- a) Defina um espaço amostral para esse experimento.
- b) Defina a v.a. X = número de chaves experimentadas até conseguir abrir a porta (inclusive a chave correta). Quais são os valores de X ? Qual é a função de probabilidade de X ?

7. Seja uma v.a. X com fdp dada na tabela a seguir:

| | | | | | | |
|------------|---|-------|-------|-----|-----|-------|
| X | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| $P(X = x)$ | 0 | p^2 | p^2 | p | p | p^2 |

- a) Encontre o valor de p .
- b) Calcule $P(X \geq 4)$ e $P(X < 3)$.
- c) Calcule $P(|X - 3| \geq 2)$.

Modelos de Probabilidade Discretos

1. Um atirador acerta na mosca do alvo, 20% dos tiros. Qual a probabilidade de ele acertar na mosca pela primeira vez no 10º tiro?
2. Joga-se um dado equilibrado. Qual é a probabilidade de serem necessários 10 lançamentos até a primeira ocorrência de um seis?
3. Joga-se um dado equilibrado. Qual é a probabilidade de serem necessários 10 lançamentos até a terceira ocorrência de um seis?
4. Um atirador acerta na mosca do alvo, 20% dos tiros. Se ele dá 10 tiros, qual a probabilidade de ele acertar na mosca no máximo 1 vez?
5. Entre os 16 programadores de uma empresa, 12 são do sexo masculino. A empresa decide sortear 5 programadores para fazer um curso avançado de programação. Qual é a probabilidade dos 5 sorteados serem do sexo masculino?
6. Uma central telefônica recebe uma média de 5 chamadas por minuto. Supondo que as chamadas que chegam constituam uma distribuição de Poisson, qual é a probabilidade de a central não receber nenhuma chamada em um minuto? e de receber no máximo 2 chamadas em 2 minutos?
7. Seja X uma v.a. aleatória binomial (n, p) com $n = 5$, $p = \frac{1}{3}$. Calcule $E(X^2)$.
8. Em um certo tipo de fabricação de fita magnética, ocorrem cortes a uma taxa de um corte por 2000 pés. Qual é a probabilidade de que um rolo com comprimento de 4000 pés apresente no máximo dois cortes? Pelo menos dois cortes?
10. A probabilidade de uma máquina produzir uma peça defeituosa em um dia é 0,1.
 - a) Qual a probabilidade de que, em 20 peças produzidas em um dia, exatamente 5 sejam defeituosas?
 - b) Qual a probabilidade de que a 10ª peça produzida em um dia seja a primeira defeituosa?
11. Certo curso de treinamento aumenta a produtividade de uma certa população de funcionários em 80% dos casos. Se 10 funcionários quaisquer participam deste curso, encontre a probabilidade de:
 - a) exatamente 7 funcionários aumentarem a produtividade;
 - b) pelo menos 3 funcionários não aumentarem a produtividade;
 - c) não mais que 8 funcionários aumentarem a produtividade.

Variável Aleatória Contínua

1. Seja X uma v.a. contínua cuja densidade de probabilidade é dada por:

$$f(x) = kx^2 \text{ se } 0 \leq x \leq 1.$$

- a) Determine o valor de k .
 - b) Calcule $P(\frac{1}{4} < X < \frac{1}{2})$.
 - c) Calcule $E(X)$ e $Var(X)$.
2. O tempo de vida útil, em anos, de um eletrodoméstico é uma variável aleatória com densidade dada por

$$f(x) = \frac{xe^{-\frac{x}{2}}}{4}, x > 0.$$

- a) Mostre que $f(x)$ integra 1.
 - b) Se o fabricante dá um tempo de garantia de seis meses para o produto, qual a proporção de aparelhos que devem usar essa garantia?
4. A percentagem de álcool ($100X$) em certo composto pode ser considerada uma variável aleatória com a seguinte fdp:

$$f(x) = 20x^3(1-x), 0 < x < 1.$$

- a) Estabeleça a FD de X .
- b) Calcule $P(X < \frac{2}{3})$.
- c) Suponha que o preço de venda desse composto dependa do conteúdo de álcool. Especificamente, se $\frac{1}{3} < X < \frac{2}{3}$, o composto se vende por C_1 dólares/galão, caso contrário ele se vende por C_2 dólares/galão. Se o custo C_3 dólares/galão, calcule a distribuição de probabilidade do lucro líquido por galão.

Modelos de Probabilidade Contínuos

1. Dada a v.a. X , uniforme em $[5, 10]$, calcule as probabilidades abaixo:
 - a) $P(X < 7)$.
 - b) $P(8 < X < 9)$.
 - c) $P(X > 8,5)$.
 - d) $P(|X - 7,5| > 2)$.
3. Suponha que a duração de uma componente eletrônica possui distribuição exponencial com parâmetro $\lambda = 1$, calcule:
 - a) A probabilidade de que a duração seja menor a 10.
 - b) A probabilidade de que a duração esteja entre 5 e 15.
 - c) O valor t tal que a probabilidade de que a duração seja maior a t assumo o valor 0.01.
4. As alturas de 10:000 alunos de um colégio têm distribuição aproximadamente normal, com média 170cm e desvio padrão 5cm . Qual o número esperado de alunos com altura superior a 165cm ?
11. O saldo médio dos clientes de um banco é uma v.a. normal com média $R\$2.000,00$ e desvio padrão $R\$250,00$. Os clientes com os 10% maiores saldos médios recebem tratamento VIP, enquanto aqueles com os 5% menores saldos médios receberão propaganda extra para estimular maior movimentação da conta.
 - a) Quanto você precisa de saldo médio para se tornar um cliente VIP?
 - b) Abaixo de qual saldo médio o cliente receberá a propaganda extra?

Referências Bibliográficas

- [1] MEYER, P.L. *Probabilidade: Aplicações à Estatística*. 2 ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1983.
- [2] BUSSAB, W.; Morettin, P. *Estatística básica*. 5.ed. São Paulo: Saraiva, 2006. ISBN 9788502034979.