



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ  
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E NATURAIS  
FACULDADE DE COMPUTAÇÃO  
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO**

**PEDRO PAULO LISBOA DE SOUSA**

**PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA  
RESOLUÇÃO DAS QUESTÕES DA LISTA DE VARIÁVEIS ALEATÓRIAS**

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ**  
**INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E NATURAIS**  
**FACULDADE DE COMPUTAÇÃO**  
**SISTEMAS DE INFORMAÇÃO**  
**ESTUDANTE: Pedro Paulo Lisboa de Sousa/ 201711140038**  
**TURMA: 2017**  
**DATA: 04 de Dezembro de 2018**

**RESOLUÇÃO DAS QUESTÕES DA LISTA  
DE VARIÁVEIS ALEATÓRIAS**

Resolução das questões da lista referentes à disciplina de Probabilidade e Estatística, do curso de Bacharelado em Sistemas de Informação, como complemento à 2ª avaliação.

Professor: Miguel Monteiro de Souza

# Sumário

Variável Aleatória Discreta . . . . .	1
Modelos de Probabilidade Discretos . . . . .	3
Variável Aleatória Contínua . . . . .	4
Modelos de Probabilidade Contínuos . . . . .	5
Referências Bibliográficas . . . . .	7

## Variável Aleatória Discreta

1. Em um determinado condomínio residencial 30% das famílias não tem filhos, 40% tem 1 filho, 20% tem 2 filhos e 10% tem 3 filhos. Seja  $X$  o número de filhos de uma família sorteada ao acaso dentro desse condomínio residencial.

30% não tem filhos

40% tem 1 filho

20% tem 2 filhos

10% tem 3 filhos

- a) Determine a função de probabilidade e a distribuição acumulada de  $X$ .

$x$ : nº de filhos

$\{0,1,2,3\} \rightarrow$  possíveis valores que  $x$  pode assumir.

$p(0) = 0,3$ ;  $p(1) = 0,4$ ;  $p(2) = 0,2$ ;  $p(3) = 0,1$

$X$	0	1	2	3
$P(x_i)$	0,3	0,4	0,2	0,1

*OBS: Falta o gráfico*

- b) Calcule a esperança e o desvio padrão de  $X$ .

$$E(X) = \sum_{i=1}^n x_i p(x_i); \text{Var}(x) = \sum_{i=1}^n x_i^2 p(x_i) - [E(X)]^2; DP = \sqrt{\text{Var}(X)}$$

$X$	$p(x_i)$	$x_i \cdot p(x_i)$
0	0,3	0
1	0,4	0,4
2	0,2	0,4
3	0,1	0,3
Total		1,1

$X$	$p(x_i)$	$x_i^2 \cdot p(x_i)$
0	0,3	0
1	0,4	0,4
2	0,2	0,8
3	0,1	0,9
Total		2,1

$E(X) = 1,1$ ;

$\text{Var}(X) = 2,1 - (1,1)^2 \rightarrow 2,1 - 1,21 = 0,89$

$DP = \sqrt{0,89} \rightarrow 0,9434$

2. Um indivíduo que possui um seguro de automóvel de uma determinada empresa é selecionado aleatoriamente. Seja  $Y$  o número de infrações ao código de trânsito para as quais o indivíduo foi reincidente nos últimos 3 anos. A função de probabilidade de  $Y$  é:

$Y$	0	1	2	3
$P(Y=y)$	0,60	0,25	0,10	0,05

- a) Calcule  $E(Y)$ .

$$E(Y) = \sum_{i=1}^n y_i p(y_i)$$

$Y$	$p(y_i)$	$y_i \cdot p(y_i)$
0	0,6	0
1	0,25	0,25
2	0,1	0,2
3	0,05	0,15
Total		0,6

Logo,  $E(Y) = 0,6$ .

- b) Suponha que um indivíduo com  $Y$  infrações reincidentes incorra em uma multa de  $U\$100Y^2$ . Calcule o valor esperado da multa.

$$v = 100Y^2 \rightarrow E(v) = E(100Y^2) \rightarrow E(v) = 100 \cdot E(Y^2)$$

$$E(Y^2) = \sum_{i=1}^n y_i^2 \cdot p(y_i)$$

Y	$p(y_i)$	$y_i \cdot p(y_i)$
0	0,6	0
1	0,25	0,25
2	0,1	0,4
3	0,05	0,45
Total		1,1

Logo,  $E(Y^2) = 1,1$ .

Com isso,  $E(v) = 100 \cdot E(Y^2) \rightarrow 100 \cdot 1,1 \rightarrow 110$ .

Valor esperado: US\$110.

5. Um dado é lançado duas vezes. Seja  $X$  a soma dos resultados. Calcule  $E(X)$ .

$$\Omega = \left\{ \begin{array}{l} (1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (1,5), (1,6) \\ (2,1), (2,2), (2,3), (2,4), (2,5), (2,6) \\ (3,1), (3,2), (3,3), (3,4), (3,5), (3,6) \\ (4,1), (4,2), (4,3), (4,4), (4,5), (4,6) \\ (5,1), (5,2), (5,3), (5,4), (5,5), (5,6) \\ (6,1), (6,2), (6,3), (6,4), (6,5), (6,6) \end{array} \right\} \quad X = \left\{ \begin{array}{l} 2, 3, 4, 5, 6, 7 \\ 3, 4, 5, 6, 7, 8 \\ 4, 5, 6, 7, 8, 9 \\ 5, 6, 7, 8, 9, 10 \\ 6, 7, 8, 9, 10, 11 \\ 7, 8, 9, 10, 11, 12 \end{array} \right\}$$

X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$p(x_i)$	$1/36$	$2/36$	$3/36$	$4/36$	$5/36$	$6/36$	$5/36$	$4/36$	$3/36$	$2/36$	$1/36$
$x_i \cdot p(x_i)$	$2/36$	$6/36$	$12/36$	$20/36$	$30/36$	$42/36$	$40/36$	$36/36$	$30/36$	$22/36$	$12/36$

$$E(X) = \sum_{i=1}^n x_i \cdot p(x_i)$$

$$E(X) = \frac{2}{36} + \frac{6}{36} + \frac{12}{36} + \dots + \frac{12}{36} = \frac{252}{36} = 7$$

6. Um homem possui 4 chaves em seu bolso. Como está escuro, ele não consegue ver qual a chave correta para abrir a porta de sua casa. Ele testa cada uma das chaves até encontrar a correta.

$C$  - chave da porta.

$E_1, E_2$  e  $E_3$  - outras chaves.

- a) Defina um espaço amostral para esse experimento.

$$\Omega = \left\{ \begin{array}{l} C, E_1C, E_2C, E_3C, E_1E_2C, E_2E_1C, E_1E_3C, E_3E_1C \\ E_2E_3C, E_3E_2C, E_1E_2E_3C, E_1E_3E_2C, E_2E_1E_3C, E_2E_3E_1C, E_3E_1E_2C, E_3E_2E_1C \end{array} \right\}$$

- b) Defina a v.a.  $X$  = número de chaves experimentadas até conseguir abrir a porta (inclusive a chave correta). Quais são os valores de  $X$ ? Qual é a função de probabilidade de  $X$ ?

$$\Omega(\text{em n}^\circ \text{ de tentativas}) = \{1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4\}$$

A partir de  $\Omega$ , podemos ver que  $X = \{1, 2, 3, 4\}$ .

$$p(1) = \frac{1}{4}$$

$$p(2) = p(E_1C \cup E_2C \cup E_3C) \rightarrow \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{3} \rightarrow 3 \cdot \frac{1}{12} \rightarrow \frac{1}{4}$$

$$p(3) = p(E_1E_2C \cup E_2E_1C \cup E_1E_3C \cup E_3E_1C \cup E_2E_3C \cup E_3E_2C) \rightarrow \frac{1}{4}$$

$$p(4) = p() \rightarrow \frac{1}{4}$$

7. Seja uma v.a.  $X$  com fdp dada na tabela a seguir:

X	0	1	2	3	4	5
$P(X=x)$	0	$p^2$	$p^2$	p	p	$p^2$

- a) Encontre o valor de  $p$ .  
b) Calcule  $P(X \geq 4)$  e  $P(X < 3)$ .  
c) Calcule  $P(|X - 3| \geq 2)$ .

## Modelos de Probabilidade Discretos

1. Um atirador acerta na mosca do alvo, 20% dos tiros. Qual a probabilidade de ele acertar na mosca pela primeira vez no 10º tiro?
2. Joga-se um dado equilibrado. Qual é a probabilidade de serem necessários 10 lançamentos até a primeira ocorrência de um seis?
3. Joga-se um dado equilibrado. Qual é a probabilidade de serem necessários 10 lançamentos até a terceira ocorrência de um seis?
4. Um atirador acerta na mosca do alvo, 20% dos tiros. Se ele dá 10 tiros, qual a probabilidade de ele acertar na mosca no máximo 1 vez?
5. Entre os 16 programadores de uma empresa, 12 são do sexo masculino. A empresa decide sortear 5 programadores para fazer um curso avançado de programação. Qual é a probabilidade dos 5 sorteados serem do sexo masculino?
6. Uma central telefônica recebe uma média de 5 chamadas por minuto. Supondo que as chamadas que chegam constituam uma distribuição de Poisson, qual é a probabilidade de a central não receber nenhuma chamada em um minuto? e de receber no máximo 2 chamadas em 2 minutos?
7. Seja  $X$  uma v.a. aleatória binomial  $(n, p)$  com  $n = 5$ ,  $p = \frac{1}{3}$ . Calcule  $E(X^2)$ .
8. Em um certo tipo de fabricação de fita magnética, ocorrem cortes a uma taxa de um corte por 2000 pés. Qual é a probabilidade de que um rolo com comprimento de 4000 pés apresente no máximo dois cortes? Pelo menos dois cortes?
10. A probabilidade de uma máquina produzir uma peça defeituosa em um dia é 0,1.
  - a) Qual a probabilidade de que, em 20 peças produzidas em um dia, exatamente 5 sejam defeituosas?
  - b) Qual a probabilidade de que a 10ª peça produzida em um dia seja a primeira defeituosa?
11. Certo curso de treinamento aumenta a produtividade de uma certa população de funcionários em 80% dos casos. Se 10 funcionários quaisquer participam deste curso, encontre a probabilidade de:
  - a) exatamente 7 funcionários aumentarem a produtividade;
  - b) pelo menos 3 funcionários não aumentarem a produtividade;
  - c) não mais que 8 funcionários aumentarem a produtividade.

## Variável Aleatória Contínua

1. Seja  $X$  uma v.a. contínua cuja densidade de probabilidade é dada por:

$$f(x) = kx^2 \text{ se } 0 \leq x \leq 1.$$

- a) Determine o valor de  $k$ .
- b) Calcule  $P(\frac{1}{4} < X < \frac{1}{2})$ .
- c) Calcule  $E(X)$  e  $Var(X)$ .

2. O tempo de vida útil, em anos, de um eletrodoméstico é uma variável aleatória com densidade dada por

$$f(x) = \frac{xe^{-x}}{4}, \quad x > 0.$$

- a) Mostre que  $f(x)$  integra 1.
  - b) Se o fabricante dá um tempo de garantia de seis meses para o produto, qual a proporção de aparelhos que devem usar essa garantia?
4. A percentagem de álcool ( $100X$ ) em certo composto pode ser considerada uma variável aleatória com a seguinte fdp:

$$f(x) = 20x^3(1-x), \quad 0 < x < 1.$$

- a) Estabeleça a  $FD$  de  $X$ .
- b) Calcule  $P(X < \frac{2}{3})$ .
- c) Suponha que o preço de venda desse composto dependa do conteúdo de álcool. Especificamente, se  $\frac{1}{3} < X < \frac{2}{3}$ , o composto se vende por  $C_1$  dólares/galão, caso contrário ele se vende por  $C_2$  dólares/galão. Se o custo  $C_3$  dólares/galão, calcule a distribuição de probabilidade do lucro líquido por galão.

## Modelos de Probabilidade Contínuos

1. Dada a v.a.  $X$ , uniforme em  $[5, 10]$ , calcule as probabilidades abaixo:
  - a)  $P(X < 7)$ .
  - b)  $P(8 < X < 9)$ .
  - c)  $P(X > 8,5)$ .
  - d)  $P(|X - 7,5| > 2)$ .
3. Suponha que a duração de uma componente eletrônica possui distribuição exponencial com parâmetro  $\lambda = 1$ , calcule:
  - a) A probabilidade de que a duração seja menor a 10.
  - b) A probabilidade de que a duração esteja entre 5 e 15.
  - c) O valor  $t$  tal que a probabilidade de que a duração seja maior a  $t$  assumo o valor 0.01.
4. As alturas de 10:000 alunos de um colégio têm distribuição aproximadamente normal, com média  $170\text{cm}$  e desvio padrão  $5\text{cm}$ . Qual o número esperado de alunos com altura superior a  $165\text{cm}$ ?
11. O saldo médio dos clientes de um banco é uma v.a. normal com média  $R\$2.000,00$  e desvio padrão  $R\$250,00$ . Os clientes com os 10% maiores saldos médios recebem tratamento VIP, enquanto aqueles com os 5% menores saldos médios receberão propaganda extra para estimular maior movimentação da conta.
  - a) Quanto você precisa de saldo médio para se tornar um cliente VIP?
  - b) Abaixo de qual saldo médio o cliente receberá a propaganda extra?





# Referências Bibliográficas

- [1] MEYER, P.L. *Probabilidade: Aplicações à Estatística*. 2 ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1983.
- [2] BUSSAB, W.; Morettin, P. *Estatística básica*. 5.ed. São Paulo: Saraiva, 2006. ISBN 9788502034979.